

表 2816 Body Mass Index 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	4 (100.0)										4 (100.0)	8	12	6.04	1.06
20～ (%)	40 (55.6)	20 (27.8)	7 (9.7)	4 (5.6)		1 (1.4)					72 (100.0)	4	76	13.81	2.64
30～ (%)	97 (3.9)	723 (29.0)	1,138 (45.6)	436 (17.5)	91 (3.6)	9 (0.4)	2 (0.1)				2,496 (100.0)	186	2,682	16.77	1.68
40～ (%)	7 (0.1)	298 (3.2)	2,391 (25.6)	3,971 (42.4)	2,090 (22.3)	515 (5.5)	74 (0.8)	8 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	9,358 (100.0)	647	10,005	19.08	1.85
50～ (%)	1 (0.0)	4 (0.0)	461 (3.9)	2,994 (25.5)	4,533 (38.6)	2,578 (22.0)	897 (7.6)	211 (1.8)	41 (0.3)	17 (0.1)	11,737 (100.0)	753	12,490	21.23	2.10
60～ (%)			1 (0.0)	209 (2.7)	1,697 (21.7)	2,984 (38.1)	1,905 (24.3)	705 (9.0)	243 (3.1)	90 (1.1)	7,834 (100.0)	531	8,365	23.57	2.22
70～ (%)		1 (0.0)			51 (1.6)	479 (14.9)	1,106 (34.4)	918 (28.6)	428 (13.3)	229 (7.1)	3,212 (100.0)	211	3,423	26.20	2.36
80～ (%)						5 (0.4)	103 (9.0)	333 (29.2)	367 (32.2)	331 (29.1)	1,139 (100.0)	134	1,273	28.86	2.26
90～ (%)							1 (0.3)	22 (5.9)	92 (24.7)	258 (69.2)	373 (100.0)	82	455	31.05	1.94
100～ (%)									4 (4.8)	80 (95.2)	84 (100.0)	58	142	32.89	1.49
110～ (%)										10 (100.0)	10 (100.0)	51	61	33.23	1.13
120～ (%)												37	37		
合計 (%)	149 (0.4)	1,046 (2.9)	3,998 (11.0)	7,614 (21.0)	8,462 (23.3)	6,571 (18.1)	4,088 (11.3)	2,197 (6.0)	1,177 (3.2)	1,017 (2.8)	36,319 (100.0)	2,702	39,021	21.67	3.65
記載なし (%)												925	925		
総計 (%)	149 (0.4)	1,046 (2.9)	3,998 (11.0)	7,614 (21.0)	8,462 (23.3)	6,571 (18.1)	4,088 (11.3)	2,197 (6.0)	1,177 (3.2)	1,017 (2.8)	36,319 (100.0)	3,627	39,946	21.67	3.65
平均	32.14	37.69	43.22	48.76	54.48	60.13	65.61	71.45	76.83	84.90	56.34	60.44	56.63		
標準偏差	5.93	4.49	5.18	5.83	6.46	6.99	7.71	8.63	9.45	11.52	12.41	19.18	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査