

表 2817 Body Mass Index 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回）

透析後体重	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	2 (100.0)										2 (100.0)	7	9	6.08	1.28
20～ (%)	4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)								6 (100.0)		6	12.63	3.78
30～ (%)	30 (11.6)	127 (49.0)	82 (31.7)	16 (6.2)	3 (1.2)	1 (0.4)					259 (100.0)	31	290	15.73	1.54
40～ (%)	6 (0.2)	229 (6.9)	1,310 (39.3)	1,388 (41.6)	366 (11.0)	28 (0.8)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	3,333 (100.0)	248	3,581	18.19	1.56
50～ (%)	1 (0.0)	4 (0.0)	453 (5.5)	2,765 (33.5)	3,524 (42.7)	1,302 (15.8)	183 (2.2)	10 (0.1)	2 (0.0)	4 (0.0)	8,248 (100.0)	521	8,769	20.53	1.67
60～ (%)			1 (0.0)	206 (3.1)	1,678 (25.1)	2,862 (42.9)	1,528 (22.9)	341 (5.1)	47 (0.7)	9 (0.1)	6,672 (100.0)	434	7,106	23.07	1.79
70～ (%)		1 (0.0)			51 (1.8)	478 (16.6)	1,092 (38.0)	865 (30.1)	313 (10.9)	72 (2.5)	2,872 (100.0)	175	3,047	25.77	1.99
80～ (%)						5 (0.5)	101 (9.7)	329 (31.6)	358 (34.4)	247 (23.8)	1,040 (100.0)	87	1,127	28.57	2.06
90～ (%)							1 (0.3)	22 (6.0)	91 (24.9)	251 (68.8)	365 (100.0)	63	428	31.01	1.93
100～ (%)									4 (4.8)	79 (95.2)	83 (100.0)	54	137	32.87	1.48
110～ (%)										10 (100.0)	10 (100.0)	47	57	33.23	1.13
120～ (%)												37	37		
合計 (%)	43 (0.2)	362 (1.6)	1,847 (8.1)	4,375 (19.1)	5,622 (24.6)	4,676 (20.4)	2,909 (12.7)	1,568 (6.9)	815 (3.6)	673 (2.9)	22,890 (100.0)	1,704	24,594	22.11	3.51
記載なし (%)												600	600		
総計 (%)	43 (0.2)	362 (1.6)	1,847 (8.1)	4,375 (19.1)	5,622 (24.6)	4,676 (20.4)	2,909 (12.7)	1,568 (6.9)	815 (3.6)	673 (2.9)	22,890 (100.0)	2,304	25,194	22.11	3.51
平均	35.64	41.50	46.90	52.09	57.51	63.05	68.82	75.09	81.06	90.04	60.89	65.39	61.21		
標準偏差	7.41	4.10	4.26	4.62	5.03	5.47	6.05	6.71	7.27	9.39	11.54	19.74	12.34		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査