

表 2827 Body Mass Index nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		2 (5.3)	6 (15.8)	7 (18.4)	9 (23.7)	6 (15.8)	4 (10.5)	3 (7.9)		1 (2.6)	38 (100.0)	5	43	21.20	3.66
0.4～ (%)	10 (1.0)	43 (4.1)	122 (11.6)	211 (20.1)	232 (22.1)	166 (15.8)	123 (11.7)	69 (6.6)	37 (3.5)	36 (3.4)	1,049 (100.0)	81	1,130	21.64	3.94
0.6～ (%)	38 (0.4)	243 (2.9)	853 (10.1)	1,647 (19.5)	1,938 (22.9)	1,606 (19.0)	999 (11.8)	560 (6.6)	306 (3.6)	267 (3.2)	8,457 (100.0)	616	9,073	21.87	3.69
0.8～ (%)	41 (0.3)	368 (2.6)	1,532 (10.9)	2,976 (21.2)	3,276 (23.4)	2,579 (18.4)	1,617 (11.5)	822 (5.9)	449 (3.2)	361 (2.6)	14,021 (100.0)	859	14,880	21.67	3.59
1.0～ (%)	25 (0.4)	209 (3.4)	795 (13.0)	1,474 (24.0)	1,441 (23.5)	1,008 (16.4)	596 (9.7)	306 (5.0)	156 (2.5)	128 (2.1)	6,138 (100.0)	393	6,531	21.19	3.49
1.2～ (%)	5 (0.5)	36 (3.3)	188 (17.0)	276 (25.0)	250 (22.6)	175 (15.8)	96 (8.7)	35 (3.2)	26 (2.4)	18 (1.6)	1,105 (100.0)	62	1,167	20.80	3.38
1.4～ (%)	3 (2.4)	10 (8.1)	19 (15.3)	28 (22.6)	31 (25.0)	16 (12.9)	10 (8.1)	1 (0.8)	6 (4.8)		124 (100.0)	4	128	20.37	3.44
1.6～ (%)		1 (7.7)	3 (23.1)	1 (7.7)	3 (23.1)	3 (23.1)		1 (7.7)		1 (7.7)	13 (100.0)		13	20.90	4.32
1.8～ (%)				1 (100.0)							1 (100.0)		1	19.95	
2.0～ (%)	3 (50.0)			1 (16.7)	1 (16.7)					1 (16.7)	6 (100.0)		6	15.55	9.51
合計 (%)	125 (0.4)	912 (2.9)	3,518 (11.4)	6,622 (21.4)	7,181 (23.2)	5,559 (18.0)	3,445 (11.1)	1,797 (5.8)	980 (3.2)	813 (2.6)	30,952 (100.0)	2,020	32,972	21.59	3.61
記載なし (%)	13 (1.2)	52 (4.7)	141 (12.8)	227 (20.6)	251 (22.8)	203 (18.4)	117 (10.6)	58 (5.3)	18 (1.6)	23 (2.1)	1,103 (100.0)	896	1,999	21.14	3.66
総計 (%)	138 (0.4)	964 (3.0)	3,659 (11.4)	6,849 (21.4)	7,432 (23.2)	5,762 (18.0)	3,562 (11.1)	1,855 (5.8)	998 (3.1)	836 (2.6)	32,055 (100.0)	2,916	34,971	21.58	3.62
平均	0.92	0.89	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.88	0.87	0.88		
標準偏差	0.36	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査