

表 2828 Body Mass Index nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		1 (5.9)		4 (23.5)	4 (23.5)	3 (17.6)	2 (11.8)	2 (11.8)		1 (5.9)	17 (100.0)	3	20	22.37	3.97
0.4～ (%)	4 (0.6)	16 (2.3)	70 (10.2)	144 (21.0)	147 (21.5)	131 (19.1)	85 (12.4)	43 (6.3)	27 (3.9)	18 (2.6)	685 (100.0)	43	728	21.83	3.69
0.6～ (%)	12 (0.2)	99 (1.7)	463 (8.2)	1,014 (17.9)	1,364 (24.1)	1,187 (20.9)	740 (13.1)	410 (7.2)	209 (3.7)	170 (3.0)	5,668 (100.0)	411	6,079	22.18	3.52
0.8～ (%)	11 (0.1)	123 (1.4)	688 (7.7)	1,762 (19.7)	2,215 (24.7)	1,830 (20.4)	1,160 (12.9)	601 (6.7)	316 (3.5)	258 (2.9)	8,964 (100.0)	541	9,505	22.13	3.47
1.0～ (%)	5 (0.1)	58 (1.7)	298 (8.8)	733 (21.6)	865 (25.5)	678 (20.0)	380 (11.2)	196 (5.8)	106 (3.1)	78 (2.3)	3,397 (100.0)	216	3,613	21.79	3.37
1.2～ (%)	3 (0.6)	6 (1.1)	62 (11.5)	120 (22.3)	142 (26.3)	97 (18.0)	61 (11.3)	21 (3.9)	16 (3.0)	11 (2.0)	539 (100.0)	30	569	21.50	3.36
1.4～ (%)	2 (4.4)	2 (4.4)	4 (8.9)	8 (17.8)	14 (31.1)	10 (22.2)	4 (8.9)		1 (2.2)		45 (100.0)	3	48	20.75	3.18
1.6～ (%)			1 (20.0)		1 (20.0)	1 (20.0)		1 (20.0)		1 (20.0)	5 (100.0)		5	23.73	5.04
1.8～ (%)															
2.0～ (%)	1 (33.3)				1 (33.3)					1 (33.3)	3 (100.0)		3	19.55	11.69
合計 (%)	38 (0.2)	305 (1.6)	1,586 (8.2)	3,785 (19.6)	4,753 (24.6)	3,937 (20.4)	2,432 (12.6)	1,274 (6.6)	675 (3.5)	538 (2.8)	19,323 (100.0)	1,247	20,570	22.05	3.48
記載なし (%)	2 (0.3)	19 (3.0)	74 (11.5)	123 (19.1)	159 (24.7)	122 (19.0)	80 (12.4)	41 (6.4)	9 (1.4)	14 (2.2)	643 (100.0)	563	1,206	21.55	3.46
総計 (%)	40 (0.2)	324 (1.6)	1,660 (8.3)	3,908 (19.6)	4,912 (24.6)	4,059 (20.3)	2,512 (12.6)	1,315 (6.6)	684 (3.4)	552 (2.8)	19,966 (100.0)	1,810	21,776	22.04	3.48
平均	0.93	0.86	0.87	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.86	0.85	0.87	0.86	0.87		
標準偏差	0.41	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査