

表 2829 Body Mass Index nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		1 (4.8)	6 (28.6)	3 (14.3)	5 (23.8)	3 (14.3)	2 (9.5)	1 (4.8)			21 (100.0)	2	23	20.26	3.18
0.4～ (%)	6 (1.6)	27 (7.4)	52 (14.3)	67 (18.4)	85 (23.4)	35 (9.6)	38 (10.4)	26 (7.1)	10 (2.7)	18 (4.9)	364 (100.0)	38	402	21.29	4.34
0.6～ (%)	26 (0.9)	144 (5.2)	390 (14.0)	633 (22.7)	574 (20.6)	419 (15.0)	259 (9.3)	150 (5.4)	97 (3.5)	97 (3.5)	2,789 (100.0)	205	2,994	21.26	3.95
0.8～ (%)	30 (0.6)	245 (4.8)	844 (16.7)	1,214 (24.0)	1,061 (21.0)	749 (14.8)	457 (9.0)	221 (4.4)	133 (2.6)	103 (2.0)	5,057 (100.0)	318	5,375	20.87	3.65
1.0～ (%)	20 (0.7)	151 (5.5)	497 (18.1)	741 (27.0)	576 (21.0)	330 (12.0)	216 (7.9)	110 (4.0)	50 (1.8)	50 (1.8)	2,741 (100.0)	177	2,918	20.45	3.48
1.2～ (%)	2 (0.4)	30 (5.3)	126 (22.3)	156 (27.6)	108 (19.1)	78 (13.8)	35 (6.2)	14 (2.5)	10 (1.8)	7 (1.2)	566 (100.0)	32	598	20.13	3.26
1.4～ (%)	1 (1.3)	8 (10.1)	15 (19.0)	20 (25.3)	17 (21.5)	6 (7.6)	6 (7.6)	1 (1.3)	5 (6.3)		79 (100.0)	1	80	20.16	3.58
1.6～ (%)		1 (12.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	2 (25.0)	2 (25.0)					8 (100.0)		8	19.13	2.85
1.8～ (%)				1 (100.0)							1 (100.0)		1	19.95	
2.0～ (%)	2 (66.7)			1 (33.3)							3 (100.0)		3	11.54	6.40
合計 (%)	87 (0.7)	607 (5.2)	1,932 (16.6)	2,837 (24.4)	2,428 (20.9)	1,622 (13.9)	1,013 (8.7)	523 (4.5)	305 (2.6)	275 (2.4)	11,629 (100.0)	773	12,402	20.83	3.71
記載なし (%)	11 (2.4)	33 (7.2)	67 (14.6)	104 (22.6)	92 (20.0)	81 (17.6)	37 (8.0)	17 (3.7)	9 (2.0)	9 (2.0)	460 (100.0)	333	793	20.55	3.85
総計 (%)	98 (0.8)	640 (5.3)	1,999 (16.5)	2,941 (24.3)	2,520 (20.8)	1,703 (14.1)	1,050 (8.7)	540 (4.5)	314 (2.6)	284 (2.3)	12,089 (100.0)	1,106	13,195	20.82	3.71
平均	0.92	0.91	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.87	0.87	0.85	0.91	0.88	0.90		
標準偏差	0.34	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査