

表 2833 Body Mass Index 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)				1 (12.5)	4 (50.0)	2 (25.0)			1 (12.5)		8 (100.0)	2	10	22.41	3.20
1.5～ (%)	2 (3.6)	6 (10.7)	13 (23.2)	13 (23.2)	8 (14.3)	9 (16.1)	2 (3.6)	1 (1.8)		2 (3.6)	56 (100.0)	6	62	19.62	3.77
2.0～ (%)	4 (1.5)	32 (11.9)	66 (24.6)	66 (24.6)	58 (21.6)	27 (10.1)	8 (3.0)	4 (1.5)	1 (0.4)	2 (0.7)	268 (100.0)	26	294	19.17	3.01
2.5～ (%)	16 (1.3)	102 (8.2)	232 (18.7)	310 (25.0)	270 (21.8)	155 (12.5)	91 (7.3)	29 (2.3)	18 (1.5)	16 (1.3)	1,239 (100.0)	153	1,392	20.08	3.39
3.0～ (%)	37 (0.5)	309 (3.8)	1,043 (12.8)	1,801 (22.1)	1,946 (23.8)	1,379 (16.9)	784 (9.6)	442 (5.4)	222 (2.7)	202 (2.5)	8,165 (100.0)	642	8,807	21.31	3.62
3.5～ (%)	70 (0.4)	413 (2.2)	1,891 (9.9)	3,888 (20.3)	4,500 (23.5)	3,649 (19.1)	2,283 (11.9)	1,230 (6.4)	639 (3.3)	563 (2.9)	19,126 (100.0)	1,459	20,585	21.87	3.61
4.0～ (%)	17 (0.3)	162 (2.4)	663 (9.9)	1,367 (20.4)	1,499 (22.4)	1,208 (18.0)	844 (12.6)	452 (6.7)	273 (4.1)	216 (3.2)	6,701 (100.0)	457	7,158	21.97	3.72
4.5～ (%)	2 (0.7)	6 (2.0)	37 (12.4)	63 (21.1)	65 (21.8)	47 (15.8)	41 (13.8)	21 (7.0)	10 (3.4)	6 (2.0)	298 (100.0)	19	317	21.69	3.65
5.0～ (%)			3 (16.7)	5 (27.8)	7 (38.9)	1 (5.6)	1 (5.6)		1 (5.6)		18 (100.0)		18	20.46	3.09
合計 (%)	148 (0.4)	1,030 (2.9)	3,948 (11.0)	7,514 (20.9)	8,357 (23.3)	6,477 (18.1)	4,054 (11.3)	2,179 (6.1)	1,165 (3.2)	1,007 (2.8)	35,879 (100.0)	2,764	38,643	21.67	3.65
記載なし (%)	1 (0.2)	16 (3.6)	50 (11.4)	100 (22.7)	105 (23.9)	94 (21.4)	34 (7.7)	18 (4.1)	12 (2.7)	10 (2.3)	440 (100.0)	863	1,303	21.33	3.40
総計 (%)	149 (0.4)	1,046 (2.9)	3,998 (11.0)	7,614 (21.0)	8,462 (23.3)	6,571 (18.1)	4,088 (11.3)	2,197 (6.0)	1,177 (3.2)	1,017 (2.8)	36,319 (100.0)	3,627	39,946	21.67	3.65
平均	3.44	3.48	3.57	3.62	3.64	3.66	3.69	3.70	3.71	3.69	3.64	3.60	3.64		
標準偏差	0.51	0.49	0.44	0.40	0.38	0.36	0.35	0.33	0.34	0.34	0.39	0.41	0.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査