

表 2835 Body Mass Index 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	2 (1.3)	5 (3.3)	22 (14.5)	25 (16.4)	32 (21.1)	26 (17.1)	18 (11.8)	14 (9.2)	5 (3.3)	3 (2.0)	152 (100.0)	8	160	21.73	3.74
7.0～ (%)		7 (2.9)	18 (7.5)	39 (16.3)	66 (27.6)	48 (20.1)	34 (14.2)	13 (5.4)	7 (2.9)	7 (2.9)	239 (100.0)	20	259	22.04	3.54
7.5～ (%)	2 (0.2)	18 (2.1)	82 (9.5)	176 (20.3)	189 (21.8)	168 (19.4)	107 (12.4)	66 (7.6)	29 (3.3)	29 (3.3)	866 (100.0)	85	951	22.01	3.63
8.0～ (%)	12 (0.5)	62 (2.3)	257 (9.7)	509 (19.1)	609 (22.9)	529 (19.9)	343 (12.9)	169 (6.4)	93 (3.5)	77 (2.9)	2,660 (100.0)	208	2,868	21.93	3.63
8.4～ (%)	8 (1.1)	18 (2.4)	74 (9.8)	163 (21.6)	186 (24.7)	137 (18.2)	81 (10.7)	53 (7.0)	19 (2.5)	15 (2.0)	754 (100.0)	64	818	21.60	3.52
8.5～ (%)	25 (0.3)	211 (2.5)	910 (10.6)	1,788 (20.8)	1,994 (23.2)	1,552 (18.1)	1,005 (11.7)	522 (6.1)	309 (3.6)	278 (3.2)	8,594 (100.0)	707	9,301	21.82	3.69
9.0～ (%)	38 (0.4)	290 (2.7)	1,135 (10.6)	2,250 (21.0)	2,543 (23.8)	1,955 (18.3)	1,205 (11.3)	648 (6.1)	334 (3.1)	308 (2.9)	10,706 (100.0)	809	11,515	21.70	3.62
9.5～ (%)	24 (0.3)	246 (3.4)	821 (11.5)	1,482 (20.7)	1,650 (23.1)	1,297 (18.2)	775 (10.8)	428 (6.0)	245 (3.4)	177 (2.5)	7,145 (100.0)	467	7,612	21.59	3.65
10.0～ (%)	6 (0.7)	22 (2.6)	108 (12.9)	189 (22.5)	210 (25.0)	137 (16.3)	82 (9.8)	54 (6.4)	16 (1.9)	15 (1.8)	839 (100.0)	64	903	21.29	3.45
10.1～ (%)	13 (0.6)	78 (3.4)	289 (12.7)	509 (22.4)	526 (23.2)	390 (17.2)	221 (9.7)	121 (5.3)	69 (3.0)	56 (2.5)	2,272 (100.0)	180	2,452	21.36	3.63
10.5～ (%)	9 (0.8)	48 (4.4)	143 (13.1)	258 (23.6)	228 (20.8)	153 (14.0)	132 (12.1)	65 (5.9)	28 (2.6)	31 (2.8)	1,095 (100.0)	75	1,170	21.30	3.79
11.0～ (%)	5 (1.4)	15 (4.3)	57 (16.2)	82 (23.3)	74 (21.0)	59 (16.8)	32 (9.1)	14 (4.0)	7 (2.0)	7 (2.0)	352 (100.0)	31	383	20.83	3.57
11.5～ (%)	2 (1.7)	6 (5.0)	18 (14.9)	26 (21.5)	26 (21.5)	17 (14.0)	11 (9.1)	10 (8.3)	3 (2.5)	2 (1.7)	121 (100.0)	11	132	21.03	3.90
12.0～ (%)	2 (3.0)	2 (3.0)	12 (17.9)	13 (19.4)	21 (31.3)	7 (10.4)	7 (10.4)	2 (3.0)		1 (1.5)	67 (100.0)	4	71	20.36	3.26
合計 (%)	148 (0.4)	1,028 (2.9)	3,946 (11.0)	7,509 (20.9)	8,354 (23.3)	6,475 (18.1)	4,053 (11.3)	2,179 (6.1)	1,164 (3.2)	1,006 (2.8)	35,862 (100.0)	2,733	38,595	21.67	3.65
記載なし (%)	1 (0.2)	18 (3.9)	52 (11.4)	105 (23.0)	108 (23.6)	96 (21.0)	35 (7.7)	18 (3.9)	13 (2.8)	11 (2.4)	457 (100.0)	894	1,351	21.30	3.44
総計 (%)	149 (0.4)	1,046 (2.9)	3,998 (11.0)	7,614 (21.0)	8,462 (23.3)	6,571 (18.1)	4,088 (11.3)	2,197 (6.0)	1,177 (3.2)	1,017 (2.8)	36,319 (100.0)	3,627	39,946	21.67	3.65
平均	9.36	9.30	9.25	9.21	9.19	9.16	9.15	9.15	9.14	9.13	9.19	9.16	9.19		
標準偏差	1.06	0.77	0.79	0.74	0.74	0.73	0.74	0.75	0.72	0.72	0.75	0.74	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査