

表 2840 Body Mass Index 総コレステロール濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

総コレステロール濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満	6	28	112	197	186	179	113	50	30	20	921	71	992	21.54	3.63
(%)	(0.7)	(3.0)	(12.2)	(21.4)	(20.2)	(19.4)	(12.3)	(5.4)	(3.3)	(2.2)	(100.0)				
100～	7	66	281	581	643	529	354	150	98	72	2,781	207	2,988	21.79	3.55
(%)	(0.3)	(2.4)	(10.1)	(20.9)	(23.1)	(19.0)	(12.7)	(5.4)	(3.5)	(2.6)	(100.0)				
120～	21	115	531	1,095	1,311	967	590	363	155	155	5,303	391	5,694	21.78	3.58
(%)	(0.4)	(2.2)	(10.0)	(20.6)	(24.7)	(18.2)	(11.1)	(6.8)	(2.9)	(2.9)	(100.0)				
140～	22	187	688	1,317	1,493	1,222	745	391	225	179	6,469	436	6,905	21.75	3.65
(%)	(0.3)	(2.9)	(10.6)	(20.4)	(23.1)	(18.9)	(11.5)	(6.0)	(3.5)	(2.8)	(100.0)				
160～	23	148	617	1,201	1,353	1,031	586	326	194	168	5,647	364	6,011	21.68	3.63
(%)	(0.4)	(2.6)	(10.9)	(21.3)	(24.0)	(18.3)	(10.4)	(5.8)	(3.4)	(3.0)	(100.0)				
180～	13	114	416	792	834	634	408	217	114	79	3,621	252	3,873	21.55	3.59
(%)	(0.4)	(3.1)	(11.5)	(21.9)	(23.0)	(17.5)	(11.3)	(6.0)	(3.1)	(2.2)	(100.0)				
200～	8	68	259	456	491	355	232	113	65	69	2,116	137	2,253	21.52	3.74
(%)	(0.4)	(3.2)	(12.2)	(21.6)	(23.2)	(16.8)	(11.0)	(5.3)	(3.1)	(3.3)	(100.0)				
220～	4	44	107	204	191	133	98	48	29	24	882	74	956	21.34	3.75
(%)	(0.5)	(5.0)	(12.1)	(23.1)	(21.7)	(15.1)	(11.1)	(5.4)	(3.3)	(2.7)	(100.0)				
240～	3	16	52	86	89	52	31	10	16	8	363	21	384	20.96	3.71
(%)	(0.8)	(4.4)	(14.3)	(23.7)	(24.5)	(14.3)	(8.5)	(2.8)	(4.4)	(2.2)	(100.0)				
260～	2	14	36	41	40	23	14	9	6	7	192	24	216	20.79	4.10
(%)	(1.0)	(7.3)	(18.8)	(21.4)	(20.8)	(12.0)	(7.3)	(4.7)	(3.1)	(3.6)	(100.0)				
合計	109	800	3,099	5,970	6,631	5,125	3,171	1,677	932	781	28,295	1,977	30,272	21.67	3.63
(%)	(0.4)	(2.8)	(11.0)	(21.1)	(23.4)	(18.1)	(11.2)	(5.9)	(3.3)	(2.8)	(100.0)				
記載なし	40	246	899	1,644	1,831	1,446	917	520	245	236	8,024	1,650	9,674	21.67	3.69
(%)	(0.5)	(3.1)	(11.2)	(20.5)	(22.8)	(18.0)	(11.4)	(6.5)	(3.1)	(2.9)	(100.0)				
総計	149	1,046	3,998	7,614	8,462	6,571	4,088	2,197	1,177	1,017	36,319	3,627	39,946	21.67	3.65
(%)	(0.4)	(2.9)	(11.0)	(21.0)	(23.3)	(18.1)	(11.3)	(6.0)	(3.2)	(2.8)	(100.0)				
平均	160.94	163.75	160.36	158.92	157.79	156.24	156.51	156.45	158.06	158.81	158.02	157.73	158.00		
標準偏差	40.70	39.62	37.54	36.11	35.10	34.33	35.04	33.79	35.85	35.13	35.59	37.24	35.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査