

表 2843 Body Mass Index 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)			1 (50.0)		1 (50.0)						2 (100.0)		2	18.59	3.20
60～ (%)	5 (4.6)	7 (6.4)	18 (16.5)	25 (22.9)	22 (20.2)	11 (10.1)	12 (11.0)	6 (5.5)	1 (0.9)	2 (1.8)	109 (100.0)	6	115	20.33	3.94
80～ (%)	10 (1.7)	37 (6.4)	93 (16.0)	138 (23.7)	131 (22.5)	95 (16.3)	37 (6.4)	22 (3.8)	6 (1.0)	13 (2.2)	582 (100.0)	33	615	20.53	3.59
100～ (%)	19 (0.7)	97 (3.7)	322 (12.2)	617 (23.5)	589 (22.4)	488 (18.6)	248 (9.4)	129 (4.9)	56 (2.1)	64 (2.4)	2,629 (100.0)	171	2,800	21.23	3.55
120～ (%)	30 (0.4)	204 (2.9)	879 (12.3)	1,537 (21.5)	1,729 (24.2)	1,286 (18.0)	738 (10.3)	386 (5.4)	187 (2.6)	159 (2.2)	7,135 (100.0)	504	7,639	21.42	3.51
140～ (%)	31 (0.3)	288 (2.7)	1,167 (11.0)	2,280 (21.4)	2,495 (23.4)	1,943 (18.2)	1,205 (11.3)	624 (5.9)	346 (3.2)	268 (2.5)	10,647 (100.0)	786	11,433	21.65	3.58
160～ (%)	29 (0.4)	188 (2.4)	747 (9.7)	1,568 (20.3)	1,793 (23.2)	1,387 (18.0)	914 (11.8)	546 (7.1)	285 (3.7)	266 (3.4)	7,723 (100.0)	585	8,308	21.95	3.74
180～ (%)	8 (0.3)	80 (2.7)	261 (8.9)	548 (18.8)	644 (22.0)	540 (18.5)	413 (14.1)	197 (6.7)	125 (4.3)	106 (3.6)	2,922 (100.0)	232	3,154	22.17	3.76
200～ (%)	2 (0.3)	20 (2.6)	68 (8.9)	135 (17.6)	180 (23.5)	139 (18.1)	93 (12.1)	49 (6.4)	39 (5.1)	42 (5.5)	767 (100.0)	55	822	22.33	3.98
220～ (%)	1 (0.5)	3 (1.5)	17 (8.6)	31 (15.7)	42 (21.3)	37 (18.8)	25 (12.7)	11 (5.6)	17 (8.6)	13 (6.6)	197 (100.0)	19	216	22.81	4.33
合計 (%)	135 (0.4)	924 (2.8)	3,573 (10.9)	6,879 (21.0)	7,626 (23.3)	5,926 (18.1)	3,685 (11.3)	1,970 (6.0)	1,062 (3.2)	933 (2.9)	32,713 (100.0)	2,391	35,104	21.68	3.65
記載なし (%)	14 (0.4)	122 (3.4)	425 (11.8)	735 (20.4)	836 (23.2)	645 (17.9)	403 (11.2)	227 (6.3)	115 (3.2)	84 (2.3)	3,606 (100.0)	1,236	4,842	21.56	3.60
総計 (%)	149 (0.4)	1,046 (2.9)	3,998 (11.0)	7,614 (21.0)	8,462 (23.3)	6,571 (18.1)	4,088 (11.3)	2,197 (6.0)	1,177 (3.2)	1,017 (2.8)	36,319 (100.0)	3,627	39,946	21.67	3.65
平均	139.23	146.59	147.49	149.14	150.23	150.77	153.31	153.51	156.59	156.15	150.57	151.98	150.67		
標準偏差	30.60	27.15	25.15	24.66	24.67	24.87	24.89	24.43	25.08	26.54	25.05	24.86	25.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査