

表 2844 Body Mass Index 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (20.0)		3 (60.0)					1 (20.0)	5 (100.0)	2	7	22.10	4.72
20～ (%)	2 (1.8)	12 (10.5)	21 (18.4)	28 (24.6)	18 (15.8)	17 (14.9)	6 (5.3)	3 (2.6)	3 (2.6)	4 (3.5)	114 (100.0)	7	121	20.33	4.08
40～ (%)	27 (1.1)	113 (4.5)	360 (14.3)	640 (25.5)	584 (23.3)	386 (15.4)	206 (8.2)	105 (4.2)	36 (1.4)	54 (2.2)	2,511 (100.0)	169	2,680	20.78	3.49
60～ (%)	59 (0.4)	433 (3.1)	1,659 (11.9)	2,964 (21.2)	3,295 (23.6)	2,642 (18.9)	1,487 (10.7)	713 (5.1)	405 (2.9)	295 (2.1)	13,952 (100.0)	1,020	14,972	21.45	3.52
80～ (%)	27 (0.3)	212 (2.5)	866 (10.3)	1,755 (20.9)	1,965 (23.4)	1,475 (17.5)	1,007 (12.0)	566 (6.7)	285 (3.4)	248 (3.0)	8,406 (100.0)	597	9,003	21.81	3.64
90～ (%)	12 (0.2)	98 (2.0)	433 (8.7)	982 (19.8)	1,174 (23.7)	892 (18.0)	621 (12.5)	362 (7.3)	192 (3.9)	184 (3.7)	4,950 (100.0)	367	5,317	22.13	3.74
100～ (%)	7 (0.3)	51 (2.0)	207 (8.3)	452 (18.1)	522 (21.0)	473 (19.0)	324 (13.0)	203 (8.1)	119 (4.8)	133 (5.3)	2,491 (100.0)	210	2,701	22.51	3.99
120～ (%)		4 (2.6)	10 (6.4)	20 (12.8)	39 (25.0)	24 (15.4)	20 (12.8)	11 (7.1)	17 (10.9)	11 (7.1)	156 (100.0)	13	169	23.07	4.19
140～ (%)				2 (20.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	2 (20.0)		10 (100.0)	2	12	24.20	4.11
合計 (%)	134 (0.4)	923 (2.8)	3,557 (10.9)	6,843 (21.0)	7,601 (23.3)	5,911 (18.1)	3,672 (11.3)	1,965 (6.0)	1,059 (3.2)	930 (2.9)	32,595 (100.0)	2,387	34,982	21.68	3.65
記載なし (%)	15 (0.4)	123 (3.3)	441 (11.8)	771 (20.7)	861 (23.1)	660 (17.7)	416 (11.2)	232 (6.2)	118 (3.2)	87 (2.3)	3,724 (100.0)	1,240	4,964	21.55	3.60
総計 (%)	149 (0.4)	1,046 (2.9)	3,998 (11.0)	7,614 (21.0)	8,462 (23.3)	6,571 (18.1)	4,088 (11.3)	2,197 (6.0)	1,177 (3.2)	1,017 (2.8)	36,319 (100.0)	3,627	39,946	21.67	3.65
平均	72.05	75.57	76.77	77.99	78.94	79.32	80.77	82.11	83.32	83.65	79.12	79.84	79.17		
標準偏差	15.65	15.39	14.57	14.64	14.44	14.29	14.24	14.61	14.93	16.17	14.68	15.06	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査