

表 2864 Body Mass Index HDL-C濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

HDL-C濃度	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (12.5)			1 (12.5)	1 (12.5)	3 (37.5)			1 (12.5)	1 (12.5)	8 (100.0)		8	22.92	5.65
20～ (%)		1 (0.4)	6 (2.4)	16 (6.4)	31 (12.4)	52 (20.8)	57 (22.8)	46 (18.4)	19 (7.6)	22 (8.8)	250 (100.0)	38	288	24.76	3.58
30～ (%)		5 (0.6)	18 (2.2)	57 (7.1)	134 (16.7)	194 (24.1)	174 (21.6)	101 (12.6)	70 (8.7)	51 (6.3)	804 (100.0)	129	933	24.18	3.49
40～ (%)		2 (0.2)	23 (2.7)	88 (10.2)	163 (18.9)	210 (24.3)	166 (19.2)	106 (12.3)	62 (7.2)	43 (5.0)	863 (100.0)	127	990	23.77	3.43
50～ (%)	5 (0.7)	8 (1.1)	26 (3.5)	113 (15.4)	162 (22.1)	185 (25.2)	122 (16.6)	61 (8.3)	27 (3.7)	25 (3.4)	734 (100.0)	105	839	22.76	3.37
60～ (%)	2 (0.4)	9 (1.9)	19 (4.1)	81 (17.5)	112 (24.2)	112 (24.2)	68 (14.7)	40 (8.6)	14 (3.0)	6 (1.3)	463 (100.0)	53	516	22.33	3.22
70～ (%)		7 (3.1)	10 (4.4)	28 (12.4)	57 (25.3)	63 (28.0)	27 (12.0)	20 (8.9)	9 (4.0)	4 (1.8)	225 (100.0)	34	259	22.44	3.29
80～ (%)	1 (0.8)		13 (10.8)	19 (15.8)	32 (26.7)	24 (20.0)	17 (14.2)	8 (6.7)	4 (3.3)	2 (1.7)	120 (100.0)	21	141	22.06	3.32
90～ (%)		2 (3.5)	5 (8.8)	8 (14.0)	17 (29.8)	11 (19.3)	8 (14.0)	4 (7.0)		2 (3.5)	57 (100.0)	4	61	21.88	3.44
100～ (%)	1 (1.9)	1 (1.9)	4 (7.5)	11 (20.8)	14 (26.4)	9 (17.0)	6 (11.3)	5 (9.4)	2 (3.8)		53 (100.0)	4	57	21.53	3.40
合計 (%)	10 (0.3)	35 (1.0)	124 (3.5)	422 (11.8)	723 (20.2)	863 (24.1)	645 (18.0)	391 (10.9)	208 (5.8)	156 (4.4)	3,577 (100.0)	515	4,092	23.33	3.51
記載なし (%)	17 (1.0)	36 (2.0)	104 (5.9)	205 (11.6)	417 (23.6)	398 (22.5)	263 (14.9)	170 (9.6)	94 (5.3)	64 (3.6)	1,768 (100.0)	3,081	4,849	22.77	3.74
総計 (%)	27 (0.5)	71 (1.3)	228 (4.3)	627 (11.7)	1,140 (21.3)	1,261 (23.6)	908 (17.0)	561 (10.5)	302 (5.7)	220 (4.1)	5,345 (100.0)	3,596	8,941	23.15	3.60
平均	62.60	62.20	58.15	55.67	54.07	50.34	47.82	47.19	44.58	42.06	50.65	49.24	50.47		
標準偏差	28.03	20.54	19.66	17.73	18.49	16.99	16.98	18.00	14.54	13.95	17.89	16.49	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査