

表 2869 透析前BUN(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	278	1,393	6,257	16,800	27,097	27,213	18,102	8,285	3,063	874	243	123	109,728	2,787	112,515	61.12	15.49
(%)	(0.3)	(1.3)	(5.7)	(15.3)	(24.7)	(24.8)	(16.5)	(7.6)	(2.8)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
女性	201	1,087	4,101	10,011	15,562	15,430	10,220	4,927	1,740	474	151	81	63,985	1,709	65,694	60.64	15.88
(%)	(0.3)	(1.7)	(6.4)	(15.6)	(24.3)	(24.1)	(16.0)	(7.7)	(2.7)	(0.7)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
合計	479	2,480	10,358	26,811	42,659	42,643	28,322	13,212	4,803	1,348	394	204	173,713	4,496	178,209	60.94	15.64
(%)	(0.3)	(1.4)	(6.0)	(15.4)	(24.6)	(24.5)	(16.3)	(7.6)	(2.8)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	479	2,480	10,358	26,811	42,659	42,643	28,322	13,212	4,803	1,348	394	204	173,713	4,496	178,209	60.94	15.64
(%)	(0.3)	(1.4)	(6.0)	(15.4)	(24.6)	(24.5)	(16.3)	(7.6)	(2.8)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査