

表 2874 透析前BUN(mg/dL) 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	3 (4.8)		5 (8.1)	11 (17.7)	15 (24.2)	17 (27.4)	8 (12.9)		1 (1.6)	1 (1.6)		1 (1.6)	62 (100.0)		62	57.19	18.82
20～ (%)	7 (1.1)	28 (4.3)	69 (10.6)	120 (18.4)	158 (24.3)	133 (20.4)	71 (10.9)	33 (5.1)	22 (3.4)	4 (0.6)	4 (0.6)	2 (0.3)	651 (100.0)	5	656	56.93	18.06
30～ (%)	96 (0.6)	417 (2.7)	1,347 (8.8)	2,627 (17.2)	3,548 (23.2)	3,329 (21.8)	2,212 (14.5)	1,077 (7.1)	433 (2.8)	120 (0.8)	34 (0.2)	28 (0.2)	15,268 (100.0)	104	15,372	58.90	16.98
40～ (%)	167 (0.4)	927 (2.0)	3,303 (7.0)	7,928 (16.8)	11,549 (24.4)	11,050 (23.4)	7,219 (15.3)	3,470 (7.3)	1,204 (2.5)	324 (0.7)	93 (0.2)	50 (0.1)	47,284 (100.0)	249	47,533	59.84	15.96
50～ (%)	146 (0.3)	687 (1.2)	3,260 (5.8)	8,702 (15.6)	14,010 (25.1)	13,823 (24.8)	9,022 (16.2)	4,083 (7.3)	1,516 (2.7)	407 (0.7)	108 (0.2)	62 (0.1)	55,826 (100.0)	280	56,106	60.86	15.39
60～ (%)	35 (0.1)	273 (0.8)	1,572 (4.6)	4,834 (14.3)	8,427 (24.9)	8,773 (25.9)	5,878 (17.4)	2,672 (7.9)	962 (2.8)	268 (0.8)	88 (0.3)	34 (0.1)	33,816 (100.0)	150	33,966	62.07	14.92
70～ (%)	15 (0.1)	95 (0.7)	507 (3.9)	1,683 (13.0)	3,255 (25.1)	3,433 (26.4)	2,371 (18.3)	1,103 (8.5)	352 (2.7)	120 (0.9)	37 (0.3)	14 (0.1)	12,985 (100.0)	56	13,041	62.82	14.81
80～ (%)	2 (0.0)	19 (0.4)	161 (3.6)	540 (12.2)	945 (21.3)	1,200 (27.1)	900 (20.3)	424 (9.6)	171 (3.9)	47 (1.1)	13 (0.3)	7 (0.2)	4,429 (100.0)	22	4,451	64.51	15.11
90～ (%)	2 (0.1)	6 (0.4)	45 (2.8)	157 (9.7)	347 (21.5)	449 (27.9)	346 (21.5)	150 (9.3)	74 (4.6)	23 (1.4)	9 (0.6)	3 (0.2)	1,611 (100.0)	4	1,615	65.63	15.25
100～ (%)		1 (0.2)	14 (2.6)	52 (9.7)	123 (22.9)	150 (27.9)	91 (16.9)	66 (12.3)	27 (5.0)	11 (2.0)	2 (0.4)		537 (100.0)	3	540	66.04	15.43
110～ (%)			3 (1.4)	19 (8.9)	28 (13.1)	55 (25.7)	54 (25.2)	33 (15.4)	12 (5.6)	4 (1.9)	4 (1.9)	2 (0.9)	214 (100.0)	1	215	70.11	16.22
120～ (%)			2 (1.5)	14 (10.2)	27 (19.7)	29 (21.2)	26 (19.0)	24 (17.5)	6 (4.4)	8 (5.8)	1 (0.7)		137 (100.0)	1	138	69.56	16.72
合計 (%)	473 (0.3)	2,453 (1.4)	10,288 (6.0)	26,687 (15.4)	42,432 (24.6)	42,441 (24.6)	28,198 (16.3)	13,135 (7.6)	4,780 (2.8)	1,337 (0.8)	393 (0.2)	203 (0.1)	172,820 (100.0)	875	173,695	60.95	15.63
記載なし (%)	6 (0.7)	27 (3.0)	70 (7.8)	124 (13.9)	227 (25.4)	202 (22.6)	124 (13.9)	77 (8.6)	23 (2.6)	11 (1.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	893 (100.0)	3,621	4,514	59.76	16.74
総計 (%)	479 (0.3)	2,480 (1.4)	10,358 (6.0)	26,811 (15.4)	42,659 (24.6)	42,643 (24.5)	28,322 (16.3)	13,212 (7.6)	4,803 (2.8)	1,348 (0.8)	394 (0.2)	204 (0.1)	173,713 (100.0)	4,496	178,209	60.94	15.64
平均	48.58	49.68	52.08	53.93	55.15	55.89	56.27	56.28	56.18	57.09	57.58	54.47	55.18	53.79	55.17		
標準偏差	10.79	10.94	11.71	12.11	12.41	12.83	13.14	13.62	14.00	15.06	15.99	14.95	12.78	12.75	12.78		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査