

表 2893 透析前BUN(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	19	180	982	2,937	5,233	5,517	3,808	1,771	654	168	49	10	21,328	448	21,776	62.35	14.94
(%)	(0.1)	(0.8)	(4.6)	(13.8)	(24.5)	(25.9)	(17.9)	(8.3)	(3.1)	(0.8)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				
女性	20	129	671	1,848	3,085	3,287	2,278	1,060	397	111	25	10	12,921	274	13,195	62.03	15.31
(%)	(0.2)	(1.0)	(5.2)	(14.3)	(23.9)	(25.4)	(17.6)	(8.2)	(3.1)	(0.9)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
合計	39	309	1,653	4,785	8,318	8,804	6,086	2,831	1,051	279	74	20	34,249	722	34,971	62.23	15.08
(%)	(0.1)	(0.9)	(4.8)	(14.0)	(24.3)	(25.7)	(17.8)	(8.3)	(3.1)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	39	309	1,653	4,785	8,318	8,804	6,086	2,831	1,051	279	74	20	34,249	722	34,971	62.23	15.08
(%)	(0.1)	(0.9)	(4.8)	(14.0)	(24.3)	(25.7)	(17.8)	(8.3)	(3.1)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査