

表 2896 透析前BUN(mg/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	9 (0.1)	81 (0.6)	497 (3.6)	1,607 (11.6)	3,166 (22.8)	3,861 (27.9)	2,710 (19.5)	1,302 (9.4)	474 (3.4)	114 (0.8)	34 (0.2)	8 (0.1)	13,863 (100.0)	263	14,126	63.90	14.63
慢性腎盂腎炎 （％）		3 (0.8)	21 (5.4)	53 (13.7)	87 (22.4)	106 (27.3)	65 (16.8)	35 (9.0)	12 (3.1)	4 (1.0)	2 (0.5)		388 (100.0)	10	398	62.60	15.28
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		3 (1.2)	8 (3.2)	29 (11.6)	64 (25.7)	57 (22.9)	47 (18.9)	26 (10.4)	12 (4.8)	2 (0.8)	1 (0.4)		249 (100.0)	1	250	64.14	15.68
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		3 (0.9)	8 (2.3)	47 (13.7)	70 (20.3)	102 (29.7)	73 (21.2)	31 (9.0)	8 (2.3)	1 (0.3)		1 (0.3)	344 (100.0)	4	348	63.70	14.09
その他の分類不 能の腎炎 （％）		1 (0.5)	8 (4.4)	19 (10.4)	55 (30.1)	38 (20.8)	34 (18.6)	17 (9.3)	11 (6.0)				183 (100.0)	3	186	63.55	15.35
多発性嚢胞腎 （％）	1 (0.1)	8 (0.6)	46 (3.5)	143 (11.0)	339 (26.1)	358 (27.6)	266 (20.5)	87 (6.7)	37 (2.8)	9 (0.7)	5 (0.4)		1,299 (100.0)	31	1,330	62.95	13.95
腎硬化症 （％）	4 (0.2)	25 (1.1)	125 (5.6)	349 (15.7)	524 (23.5)	545 (24.5)	387 (17.4)	173 (7.8)	68 (3.1)	17 (0.8)	5 (0.2)	4 (0.2)	2,226 (100.0)	26	2,252	61.50	15.58
悪性高血圧 （％）	1 (0.4)	1 (0.4)	10 (3.8)	33 (12.5)	62 (23.4)	72 (27.2)	47 (17.7)	25 (9.4)	10 (3.8)	3 (1.1)	1 (0.4)		265 (100.0)	5	270	63.77	15.49
糖尿病性腎症 （％）	17 (0.2)	147 (1.4)	718 (6.8)	1,872 (17.7)	2,799 (26.4)	2,445 (23.1)	1,547 (14.6)	717 (6.8)	250 (2.4)	73 (0.7)	16 (0.2)	5 (0.0)	10,606 (100.0)	239	10,845	59.58	15.25
SLE腎炎 （％）		2 (0.6)	12 (3.6)	38 (11.5)	71 (21.5)	76 (23.0)	76 (23.0)	30 (9.1)	20 (6.0)	6 (1.8)			331 (100.0)	6	337	65.53	16.01
アミロイド腎 （％）	1 (2.3)			11 (25.6)	8 (18.6)	10 (23.3)	6 (14.0)	6 (14.0)	1 (2.3)				43 (100.0)		43	60.88	15.11
痛風腎 （％）	1 (0.7)	11 (8.1)	21 (15.4)	26 (19.1)	33 (24.3)	26 (19.1)	12 (8.8)	5 (3.7)			1 (0.7)		136 (100.0)	6	142	62.07	16.11
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			1 (2.6)	3 (7.9)	10 (26.3)	12 (31.6)	7 (18.4)	4 (10.5)	1 (2.6)				38 (100.0)	3	41	64.87	12.52
腎・尿路結核 （％）			3 (15.8)	3 (15.8)	3 (15.8)	3 (15.8)	2 (10.5)	2 (10.5)	3 (15.8)				19 (100.0)	1	20	62.68	19.85
腎・尿路結石 （％）			4 (6.3)	12 (19.0)	16 (25.4)	13 (20.6)	13 (20.6)	2 (3.2)	2 (3.2)	1 (1.6)			63 (100.0)	1	64	60.19	14.99
腎・尿路腫瘍 （％）				6 (9.7)	19 (30.6)	22 (35.5)	9 (14.5)	5 (8.1)	1 (1.6)				62 (100.0)		62	62.56	11.09
閉塞性尿路障害 （％）			3 (4.5)	7 (10.6)	18 (27.3)	13 (19.7)	14 (21.2)	8 (12.1)	1 (1.5)	2 (3.0)			66 (100.0)	3	69	63.91	14.87
骨髄腫 （％）			1 (9.1)	2 (18.2)	3 (27.3)	2 (18.2)	2 (18.2)	1 (9.1)					11 (100.0)		11	59.45	14.27
腎形成不全 （％）			2 (2.1)	5 (5.3)	20 (21.3)	26 (27.7)	16 (17.0)	14 (14.9)	7 (7.4)	3 (3.2)		1 (1.1)	94 (100.0)	1	95	69.32	16.47
不明 （％）	4 (0.1)	28 (1.0)	139 (4.9)	395 (13.9)	716 (25.1)	696 (24.4)	501 (17.6)	236 (8.3)	99 (3.5)	28 (1.0)	7 (0.2)		2,849 (100.0)	105	2,954	62.28	15.28
再導入 （％）	1 (0.3)		9 (2.4)	32 (8.5)	86 (22.8)	116 (30.7)	78 (20.6)	37 (9.8)	11 (2.9)	7 (1.9)	1 (0.3)		378 (100.0)	7	385	65.56	14.47
その他 （％）	2 (0.3)	5 (0.7)	27 (3.7)	98 (13.3)	156 (21.2)	198 (26.9)	160 (21.7)	61 (8.3)	18 (2.4)	9 (1.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	736 (100.0)	7	743	63.38	14.78
合計 （％）	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
記載なし （％）																	
総計 （％）	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査