

表 2902 透析前BUN(mg/dL) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	28 (65.1)	6 (14.0)		5 (11.6)	2 (4.7)	2 (4.7)							43 (100.0)		43	22.84	15.72
0.4～ (%)	8 (0.7)	271 (24.0)	752 (66.5)	84 (7.4)	7 (0.6)	3 (0.3)	4 (0.4)	1 (0.1)					1,130 (100.0)		1,130	32.90	6.40
0.6～ (%)	1 (0.0)		811 (8.9)	4,395 (48.4)	3,549 (39.1)	295 (3.3)	20 (0.2)	1 (0.0)		1 (0.0)			9,073 (100.0)		9,073	48.22	6.31
0.8～ (%)				116 (0.8)	4,468 (30.0)	7,614 (51.2)	2,490 (16.7)	181 (1.2)	9 (0.1)	2 (0.0)			14,880 (100.0)		14,880	63.32	6.77
1.0～ (%)		1 (0.0)		2 (0.0)	8 (0.1)	600 (9.2)	3,306 (50.6)	2,176 (33.3)	406 (6.2)	31 (0.5)	1 (0.0)		6,531 (100.0)		6,531	78.25	7.12
1.2～ (%)					3 (0.3)	4 (0.3)	27 (2.3)	365 (31.3)	574 (49.2)	160 (13.7)	33 (2.8)	1 (0.1)	1,167 (100.0)		1,167	92.72	7.86
1.4～ (%)				1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)		1 (0.8)	17 (13.3)	64 (50.0)	35 (27.3)	8 (6.3)	128 (100.0)		128	106.10	11.60
1.6～ (%)					2 (15.4)		1 (7.7)				4 (30.8)	6 (46.2)	13 (100.0)		13	107.62	28.37
1.8～ (%)						1 (100.0)							1 (100.0)		1	67.00	
2.0～ (%)					4 (66.7)							2 (33.3)	6 (100.0)		6	93.67	58.12
合計 (%)	37 (0.1)	278 (0.8)	1,563 (4.7)	4,603 (14.0)	8,044 (24.4)	8,520 (25.8)	5,848 (17.7)	2,725 (8.3)	1,006 (3.1)	258 (0.8)	73 (0.2)	17 (0.1)	32,972 (100.0)		32,972	62.26	15.01
記載なし (%)	2 (0.2)	31 (2.4)	90 (7.0)	182 (14.3)	274 (21.5)	284 (22.2)	238 (18.6)	106 (8.3)	45 (3.5)	21 (1.6)	1 (0.1)	3 (0.2)	1,277 (100.0)	722	1,999	61.66	16.97
総計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
平均	0.38	0.49	0.60	0.70	0.80	0.91	1.01	1.11	1.21	1.31	1.41	1.63	0.88		0.88		
標準偏差	0.08	0.06	0.04	0.05	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.12	0.11	0.26	0.17		0.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査