

表 2906 透析前BUN(mg/dL) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前補正 カルシウム濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)			5 (3.7)	19 (14.1)	24 (17.8)	40 (29.6)	23 (17.0)	13 (9.6)	11 (8.1)				135 (100.0)		135	65.27	15.28
7.0～ (%)			6 (2.7)	14 (6.3)	46 (20.7)	67 (30.2)	43 (19.4)	24 (10.8)	17 (7.7)	5 (2.3)			222 (100.0)		222	67.71	14.96
7.5～ (%)		4 (0.5)	29 (3.7)	74 (9.6)	157 (20.3)	217 (28.0)	161 (20.8)	87 (11.2)	30 (3.9)	11 (1.4)	4 (0.5)		774 (100.0)	1	775	65.45	15.13
8.0～ (%)	2 (0.1)	8 (0.3)	79 (3.4)	294 (12.5)	544 (23.1)	599 (25.5)	451 (19.2)	241 (10.2)	110 (4.7)	19 (0.8)	6 (0.3)		2,353 (100.0)		2,353	64.32	14.97
8.4～ (%)	1 (0.1)	3 (0.4)	31 (4.6)	85 (12.5)	157 (23.1)	197 (29.0)	123 (18.1)	52 (7.7)	24 (3.5)	5 (0.7)		1 (0.1)	679 (100.0)		679	62.91	14.51
8.5～ (%)	6 (0.1)	47 (0.6)	343 (4.4)	1,048 (13.5)	1,883 (24.3)	1,982 (25.6)	1,430 (18.5)	665 (8.6)	252 (3.3)	69 (0.9)	14 (0.2)	9 (0.1)	7,748 (100.0)	5	7,753	62.88	14.99
9.0～ (%)	10 (0.1)	72 (0.7)	510 (5.0)	1,418 (14.0)	2,488 (24.5)	2,648 (26.1)	1,792 (17.7)	829 (8.2)	277 (2.7)	82 (0.8)	20 (0.2)	4 (0.0)	10,150 (100.0)	6	10,156	62.07	14.82
9.5～ (%)	8 (0.1)	80 (1.1)	343 (4.9)	1,016 (14.6)	1,711 (24.5)	1,794 (25.7)	1,230 (17.6)	537 (7.7)	180 (2.6)	55 (0.8)	18 (0.3)	2 (0.0)	6,974 (100.0)	4	6,978	61.67	15.01
10.0～ (%)	1 (0.1)	12 (1.4)	38 (4.5)	131 (15.7)	224 (26.8)	198 (23.7)	155 (18.5)	49 (5.9)	19 (2.3)	5 (0.6)	4 (0.5)		836 (100.0)	1	837	60.68	14.96
10.1～ (%)	3 (0.1)	38 (1.7)	139 (6.1)	343 (15.0)	581 (25.4)	574 (25.1)	351 (15.4)	167 (7.3)	64 (2.8)	17 (0.7)	5 (0.2)	1 (0.0)	2,283 (100.0)	1	2,284	60.57	15.54
10.5～ (%)	4 (0.4)	20 (1.8)	71 (6.4)	177 (16.0)	280 (25.4)	273 (24.8)	159 (14.4)	85 (7.7)	29 (2.6)	3 (0.3)	2 (0.2)		1,103 (100.0)		1,103	59.86	15.35
11.0～ (%)	1 (0.3)	8 (2.2)	29 (8.1)	65 (18.2)	83 (23.2)	74 (20.7)	50 (14.0)	33 (9.2)	10 (2.8)	2 (0.6)		2 (0.6)	357 (100.0)		357	59.81	17.19
11.5～ (%)	1 (0.9)	7 (6.3)	5 (4.5)	21 (18.8)	28 (25.0)	17 (15.2)	18 (16.1)	9 (8.0)	4 (3.6)	1 (0.9)	1 (0.9)		112 (100.0)		112	59.23	18.24
12.0～ (%)	1 (1.5)	1 (1.5)	5 (7.7)	13 (20.0)	14 (21.5)	17 (26.2)	10 (15.4)	4 (6.2)					65 (100.0)		65	57.75	15.17
合計 (%)	38 (0.1)	300 (0.9)	1,633 (4.8)	4,718 (14.0)	8,220 (24.3)	8,697 (25.7)	5,996 (17.7)	2,795 (8.3)	1,027 (3.0)	274 (0.8)	74 (0.2)	19 (0.1)	33,791 (100.0)	18	33,809	62.22	15.07
記載なし (%)	1 (0.2)	9 (2.0)	20 (4.4)	67 (14.6)	98 (21.4)	107 (23.4)	90 (19.7)	36 (7.9)	24 (5.2)	5 (1.1)		1 (0.2)	458 (100.0)	704	1,162	62.89	16.23
総計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
平均	9.65	9.59	9.31	9.28	9.24	9.20	9.18	9.15	9.08	9.09	9.23	9.28	9.22	9.22	9.22		
標準偏差	1.03	0.79	0.76	0.75	0.73	0.74	0.74	0.76	0.79	0.71	0.74	0.78	0.75	0.60	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査