

表 2908 透析前BUN(mg/dL) PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	2 (0.1)	32 (2.2)	87 (5.9)	220 (15.0)	352 (24.0)	340 (23.2)	273 (18.6)	113 (7.7)	38 (2.6)	6 (0.4)	4 (0.3)		1,467 (100.0)	4	1,471	60.93	15.57
20～ (%)	3 (0.2)	40 (2.1)	118 (6.2)	331 (17.4)	452 (23.7)	462 (24.2)	290 (15.2)	132 (6.9)	58 (3.0)	17 (0.9)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,906 (100.0)	1	1,907	60.23	15.76
40～ (%)	6 (0.3)	31 (1.5)	114 (5.3)	358 (16.8)	512 (24.0)	503 (23.6)	356 (16.7)	165 (7.7)	71 (3.3)	13 (0.6)	3 (0.1)	1 (0.0)	2,133 (100.0)	2	2,135	60.98	15.52
60～ (%)	4 (0.2)	30 (1.3)	134 (6.0)	323 (14.5)	579 (26.0)	549 (24.6)	371 (16.6)	171 (7.7)	51 (2.3)	14 (0.6)	3 (0.1)		2,229 (100.0)	1	2,230	60.78	15.06
80～ (%)	2 (0.1)	18 (0.7)	136 (5.4)	393 (15.7)	634 (25.3)	625 (24.9)	420 (16.8)	176 (7.0)	77 (3.1)	18 (0.7)	7 (0.3)	1 (0.0)	2,507 (100.0)	4	2,511	61.36	15.12
100～ (%)	1 (0.0)	30 (1.2)	127 (5.2)	367 (14.9)	627 (25.5)	612 (24.9)	433 (17.6)	194 (7.9)	48 (2.0)	11 (0.4)	6 (0.2)	1 (0.0)	2,457 (100.0)	2	2,459	61.30	14.79
120～ (%)	3 (0.1)	18 (0.8)	123 (5.4)	303 (13.3)	586 (25.7)	606 (26.6)	400 (17.5)	169 (7.4)	49 (2.1)	20 (0.9)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,281 (100.0)		2,281	61.54	14.62
140～ (%)	2 (0.1)	6 (0.3)	88 (4.3)	291 (14.3)	507 (25.0)	552 (27.2)	347 (17.1)	163 (8.0)	55 (2.7)	15 (0.7)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,032 (100.0)	3	2,035	62.30	14.59
160～ (%)	2 (0.1)	12 (0.6)	80 (4.2)	249 (13.2)	455 (24.0)	529 (28.0)	341 (18.0)	152 (8.0)	59 (3.1)	11 (0.6)	2 (0.1)		1,892 (100.0)		1,892	62.52	14.37
180～ (%)	10 (0.2)	21 (0.5)	172 (3.9)	548 (12.5)	1,084 (24.8)	1,186 (27.1)	795 (18.2)	381 (8.7)	134 (3.1)	34 (0.8)	10 (0.2)	4 (0.1)	4,379 (100.0)	1	4,380	62.99	14.77
240～ (%)			2 (2.9)	5 (7.1)	12 (17.1)	17 (24.3)	23 (32.9)	7 (10.0)	2 (2.9)	1 (1.4)	1 (1.4)		70 (100.0)		70	67.89	14.27
241～ (%)	2 (0.1)	13 (0.5)	82 (3.2)	309 (12.0)	592 (23.0)	723 (28.1)	493 (19.2)	228 (8.9)	96 (3.7)	24 (0.9)	9 (0.3)	1 (0.0)	2,572 (100.0)	3	2,575	63.86	14.63
300～ (%)		6 (0.4)	57 (3.8)	188 (12.6)	336 (22.6)	387 (26.0)	269 (18.1)	145 (9.7)	74 (5.0)	16 (1.1)	9 (0.6)	2 (0.1)	1,489 (100.0)		1,489	64.42	15.51
360～ (%)		1 (0.1)	27 (2.9)	93 (10.1)	209 (22.6)	259 (28.1)	196 (21.2)	92 (10.0)	32 (3.5)	12 (1.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	923 (100.0)	2	925	64.99	14.35
420～ (%)		2 (0.4)	13 (2.5)	60 (11.5)	117 (22.3)	130 (24.8)	116 (22.1)	54 (10.3)	22 (4.2)	8 (1.5)	2 (0.4)		524 (100.0)		524	65.32	15.03
480～ (%)			4 (3.2)	11 (8.8)	33 (26.4)	26 (20.8)	24 (19.2)	17 (13.6)	5 (4.0)	4 (3.2)	1 (0.8)		125 (100.0)		125	66.26	16.10
500～ (%)			3 (1.5)	21 (10.3)	33 (16.2)	67 (32.8)	39 (19.1)	28 (13.7)	7 (3.4)	4 (2.0)	2 (1.0)		204 (100.0)		204	67.23	14.86
540～ (%)		2 (0.9)	4 (1.7)	34 (14.7)	45 (19.5)	65 (28.1)	50 (21.6)	20 (8.7)	9 (3.9)	2 (0.9)			231 (100.0)	1	232	64.47	14.20
600～ (%)		2 (0.5)	5 (1.3)	34 (8.7)	93 (23.8)	85 (21.7)	85 (21.7)	65 (16.6)	16 (4.1)	5 (1.3)		1 (0.3)	391 (100.0)		391	66.98	14.76
800～ (%)	1 (0.3)	2 (0.6)	12 (3.6)	36 (10.8)	51 (15.3)	84 (25.1)	70 (21.0)	46 (13.8)	20 (6.0)	8 (2.4)	4 (1.2)		334 (100.0)		334	67.37	16.80
合計 (%)	38 (0.1)	266 (0.9)	1,388 (4.6)	4,174 (13.8)	7,309 (24.2)	7,807 (25.9)	5,391 (17.9)	2,518 (8.4)	923 (3.1)	243 (0.8)	71 (0.2)	18 (0.1)	30,146 (100.0)	24	30,170	62.36	15.06
記載なし (%)		8 (1.7)	34 (7.1)	69 (14.4)	110 (23.0)	104 (21.8)	86 (18.0)	48 (10.0)	14 (2.9)	4 (0.8)		1 (0.2)	478 (100.0)	98	576	61.47	16.15
総計 (%)	38 (0.1)	274 (0.9)	1,422 (4.6)	4,243 (13.9)	7,419 (24.2)	7,911 (25.8)	5,477 (17.9)	2,566 (8.4)	937 (3.1)	247 (0.8)	71 (0.2)	19 (0.1)	30,624 (100.0)	122	30,746	62.35	15.08
平均	138.82	115.39	149.67	162.46	169.92	181.69	189.83	204.51	207.66	235.67	245.03	209.28	178.82	148.83	178.80		
標準偏差	139.58	135.06	187.10	167.05	146.93	165.19	193.50	201.76	202.16	239.97	239.49	140.67	173.73	143.76	173.71		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査