

表 2914 透析前BUN(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前収縮期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)						1 (100.0)							1 (100.0)		1	63.00	
60～ (%)		3 (2.8)	6 (5.5)	21 (19.3)	23 (21.1)	23 (21.1)	20 (18.3)	7 (6.4)	4 (3.7)	1 (0.9)	1 (0.9)		109 (100.0)	1	110	60.59	17.01
80～ (%)	1 (0.2)	8 (1.4)	50 (9.0)	89 (16.1)	129 (23.3)	134 (24.2)	85 (15.3)	33 (6.0)	16 (2.9)	8 (1.4)		1 (0.2)	554 (100.0)	7	561	59.81	15.98
100～ (%)	6 (0.2)	29 (1.2)	114 (4.6)	384 (15.6)	599 (24.3)	646 (26.2)	415 (16.9)	173 (7.0)	75 (3.0)	17 (0.7)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,461 (100.0)	13	2,474	61.28	14.97
120～ (%)	4 (0.1)	49 (0.7)	322 (4.8)	905 (13.6)	1,605 (24.1)	1,721 (25.9)	1,190 (17.9)	566 (8.5)	206 (3.1)	57 (0.9)	18 (0.3)	3 (0.0)	6,646 (100.0)	29	6,675	62.54	15.01
140～ (%)	15 (0.2)	90 (0.9)	443 (4.4)	1,315 (13.2)	2,438 (24.4)	2,612 (26.1)	1,841 (18.4)	835 (8.4)	313 (3.1)	74 (0.7)	17 (0.2)	5 (0.1)	9,998 (100.0)	41	10,039	62.55	14.95
160～ (%)	5 (0.1)	59 (0.8)	347 (4.8)	1,013 (13.9)	1,781 (24.5)	1,900 (26.1)	1,268 (17.4)	603 (8.3)	213 (2.9)	56 (0.8)	20 (0.3)	6 (0.1)	7,271 (100.0)	18	7,289	62.19	14.97
180～ (%)	4 (0.1)	24 (0.9)	163 (6.0)	400 (14.6)	648 (23.7)	649 (23.8)	489 (17.9)	237 (8.7)	83 (3.0)	23 (0.8)	10 (0.4)	1 (0.0)	2,731 (100.0)	4	2,735	62.03	15.63
200～ (%)	1 (0.1)	4 (0.6)	30 (4.3)	106 (15.0)	188 (26.7)	159 (22.6)	130 (18.4)	59 (8.4)	18 (2.6)	8 (1.1)	2 (0.3)		705 (100.0)	1	706	62.09	15.00
220～ (%)		3 (1.6)	13 (7.1)	27 (14.8)	44 (24.2)	41 (22.5)	32 (17.6)	13 (7.1)	6 (3.3)	3 (1.6)			182 (100.0)		182	61.04	16.00
合計 (%)	36 (0.1)	269 (0.9)	1,488 (4.9)	4,260 (13.9)	7,455 (24.3)	7,886 (25.7)	5,470 (17.8)	2,526 (8.2)	934 (3.0)	247 (0.8)	70 (0.2)	17 (0.1)	30,658 (100.0)	114	30,772	62.24	15.07
記載なし (%)	3 (0.1)	40 (1.1)	165 (4.6)	525 (14.6)	863 (24.0)	918 (25.6)	616 (17.2)	305 (8.5)	117 (3.3)	32 (0.9)	4 (0.1)	3 (0.1)	3,591 (100.0)	608	4,199	62.18	15.21
総計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
平均	148.61	147.68	150.52	150.22	150.71	150.19	150.88	151.29	150.10	151.06	153.83	149.76	150.54	140.72	150.50		
標準偏差	26.40	26.99	26.72	26.00	25.02	24.50	24.82	24.29	25.04	27.39	24.94	25.79	25.06	25.50	25.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査