

表 2917 BUN(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	13	86	389	829	1,036	785	399	184	65	27	4	5	3,822	1,920	5,742	56.26	15.76
(%)	(0.3)	(2.3)	(10.2)	(21.7)	(27.1)	(20.5)	(10.4)	(4.8)	(1.7)	(0.7)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
女性	16	97	283	563	577	365	150	61	24	13	3	2	2,154	1,045	3,199	52.50	15.65
(%)	(0.7)	(4.5)	(13.1)	(26.1)	(26.8)	(16.9)	(7.0)	(2.8)	(1.1)	(0.6)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
合計	29	183	672	1,392	1,613	1,150	549	245	89	40	7	7	5,976	2,965	8,941	54.90	15.82
(%)	(0.5)	(3.1)	(11.2)	(23.3)	(27.0)	(19.2)	(9.2)	(4.1)	(1.5)	(0.7)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	29	183	672	1,392	1,613	1,150	549	245	89	40	7	7	5,976	2,965	8,941	54.90	15.82
(%)	(0.5)	(3.1)	(11.2)	(23.3)	(27.0)	(19.2)	(9.2)	(4.1)	(1.5)	(0.7)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査