

表 2926 BUN(mg/dL) 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		1 (3.4)	2 (6.9)	7 (24.1)	3 (10.3)	8 (27.6)	4 (13.8)		3 (10.3)	1 (3.4)			29 (100.0)		29	61.28	18.98
7.0～ (%)			3 (8.3)	8 (22.2)	6 (16.7)	11 (30.6)	6 (16.7)	1 (2.8)	1 (2.8)				36 (100.0)		36	59.36	13.98
7.5～ (%)	1 (0.8)	3 (2.4)	4 (3.1)	25 (19.7)	41 (32.3)	19 (15.0)	15 (11.8)	12 (9.4)		5 (3.9)	2 (1.6)		127 (100.0)		127	60.53	17.75
8.0～ (%)		2 (0.7)	27 (9.6)	48 (17.0)	80 (28.4)	71 (25.2)	30 (10.6)	15 (5.3)	4 (1.4)	3 (1.1)		2 (0.7)	282 (100.0)	4	286	58.54	15.41
8.4～ (%)			6 (7.3)	15 (18.3)	25 (30.5)	23 (28.0)	5 (6.1)	3 (3.7)	2 (2.4)	3 (3.7)			82 (100.0)	4	86	59.01	15.68
8.5～ (%)	3 (0.3)	19 (2.1)	85 (9.5)	198 (22.0)	239 (26.6)	185 (20.6)	88 (9.8)	51 (5.7)	22 (2.4)	6 (0.7)	2 (0.2)		898 (100.0)	8	906	56.78	15.71
9.0～ (%)	6 (0.4)	36 (2.3)	185 (11.6)	379 (23.8)	448 (28.1)	289 (18.2)	162 (10.2)	59 (3.7)	19 (1.2)	7 (0.4)		2 (0.1)	1,592 (100.0)	10	1,602	54.84	15.39
9.5～ (%)	8 (0.5)	58 (3.6)	182 (11.3)	377 (23.3)	418 (25.9)	332 (20.5)	149 (9.2)	58 (3.6)	21 (1.3)	10 (0.6)	2 (0.1)	2 (0.1)	1,617 (100.0)	12	1,629	54.66	16.06
10.0～ (%)	3 (1.6)	8 (4.3)	23 (12.3)	37 (19.8)	54 (28.9)	32 (17.1)	20 (10.7)	7 (3.7)	2 (1.1)		1 (0.5)		187 (100.0)	4	191	53.75	15.99
10.1～ (%)	3 (0.5)	22 (4.0)	77 (13.9)	152 (27.4)	158 (28.5)	68 (12.3)	42 (7.6)	23 (4.2)	9 (1.6)				554 (100.0)	3	557	52.19	14.90
10.5～ (%)	2 (0.7)	15 (5.1)	41 (13.9)	79 (26.8)	74 (25.1)	63 (21.4)	8 (2.7)	7 (2.4)	2 (0.7)	4 (1.4)			295 (100.0)	1	296	51.48	14.74
11.0～ (%)		12 (10.8)	13 (11.7)	28 (25.2)	25 (22.5)	21 (18.9)	8 (7.2)	3 (2.7)	1 (0.9)				111 (100.0)		111	50.99	15.57
11.5～ (%)		2 (7.1)	4 (14.3)	5 (17.9)	4 (14.3)	6 (21.4)	3 (10.7)	2 (7.1)	2 (7.1)				28 (100.0)	1	29	56.79	18.92
12.0～ (%)	1 (3.7)	2 (7.4)	3 (11.1)	6 (22.2)	12 (44.4)	2 (7.4)		1 (3.7)					27 (100.0)		27	47.00	15.39
合計 (%)	27 (0.5)	180 (3.1)	655 (11.2)	1,364 (23.3)	1,587 (27.1)	1,130 (19.3)	540 (9.2)	242 (4.1)	88 (1.5)	39 (0.7)	7 (0.1)	6 (0.1)	5,865 (100.0)	47	5,912	54.95	15.78
記載なし (%)	2 (1.8)	3 (2.7)	17 (15.3)	28 (25.2)	26 (23.4)	20 (18.0)	9 (8.1)	3 (2.7)	1 (0.9)	1 (0.9)		1 (0.9)	111 (100.0)	2,918	3,029	52.37	17.77
総計 (%)	29 (0.5)	183 (3.1)	672 (11.2)	1,392 (23.3)	1,613 (27.0)	1,150 (19.2)	549 (9.2)	245 (4.1)	89 (1.5)	40 (0.7)	7 (0.1)	7 (0.1)	5,976 (100.0)	2,965	8,941	54.90	15.82
平均	9.71	9.74	9.52	9.46	9.40	9.33	9.29	9.28	9.25	9.01	8.87	9.05	9.41	9.31	9.41		
標準偏差	0.82	0.87	0.75	0.78	0.77	0.82	0.75	0.79	1.03	1.01	0.91	0.69	0.80	0.73	0.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査