

表 2928 BUN(mg/dL) PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		4 (3.3)	22 (18.2)	26 (21.5)	38 (31.4)	19 (15.7)	8 (6.6)	2 (1.7)	1 (0.8)	1 (0.8)			121 (100.0)	2	123	51.88	14.16
20～ (%)	1 (0.4)	11 (4.0)	31 (11.2)	65 (23.4)	78 (28.1)	47 (16.9)	29 (10.4)	10 (3.6)	5 (1.8)	1 (0.4)			278 (100.0)	3	281	54.31	15.45
40～ (%)	3 (1.1)	10 (3.8)	32 (12.1)	58 (21.9)	85 (32.1)	43 (16.2)	21 (7.9)	9 (3.4)	4 (1.5)				265 (100.0)	3	268	53.26	14.67
60～ (%)	1 (0.3)	11 (3.6)	27 (8.7)	96 (31.1)	81 (26.2)	63 (20.4)	24 (7.8)	5 (1.6)	1 (0.3)				309 (100.0)	6	315	52.76	12.70
80～ (%)		9 (3.0)	34 (11.1)	69 (22.6)	96 (31.5)	56 (18.4)	22 (7.2)	11 (3.6)	6 (2.0)	2 (0.7)			305 (100.0)	4	309	54.57	14.60
100～ (%)	2 (0.6)	10 (3.2)	33 (10.5)	75 (23.9)	74 (23.6)	74 (23.6)	23 (7.3)	14 (4.5)	7 (2.2)	2 (0.6)			314 (100.0)	2	316	55.19	15.23
120～ (%)	1 (0.3)	10 (3.3)	32 (10.7)	66 (22.0)	81 (27.0)	51 (17.0)	35 (11.7)	19 (6.3)	2 (0.7)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	300 (100.0)	5	305	55.75	16.08
140～ (%)	3 (1.1)	5 (1.8)	31 (10.9)	69 (24.3)	89 (31.3)	53 (18.7)	19 (6.7)	11 (3.9)	3 (1.1)	1 (0.4)			284 (100.0)	1	285	53.80	14.14
160～ (%)	1 (0.4)	6 (2.2)	37 (13.6)	54 (19.8)	74 (27.1)	61 (22.3)	28 (10.3)	8 (2.9)	2 (0.7)	2 (0.7)			273 (100.0)	3	276	54.74	14.48
180～ (%)	3 (0.5)	16 (2.5)	70 (10.8)	162 (25.1)	168 (26.0)	125 (19.3)	57 (8.8)	28 (4.3)	9 (1.4)	6 (0.9)	2 (0.3)		646 (100.0)	8	654	55.08	15.79
240～ (%)		1 (10.0)		3 (30.0)	4 (40.0)		1 (10.0)	1 (10.0)					10 (100.0)		10	53.50	17.23
241～ (%)	2 (0.5)	11 (2.6)	40 (9.4)	101 (23.8)	114 (26.8)	81 (19.1)	51 (12.0)	17 (4.0)	5 (1.2)	3 (0.7)			425 (100.0)	6	431	55.84	14.82
300～ (%)	1 (0.3)	8 (2.4)	31 (9.4)	70 (21.1)	94 (28.4)	68 (20.5)	34 (10.3)	16 (4.8)	7 (2.1)	1 (0.3)			331 (100.0)		331	56.98	18.04
360～ (%)	1 (0.5)	5 (2.6)	15 (7.7)	49 (25.0)	55 (28.1)	39 (19.9)	15 (7.7)	10 (5.1)	3 (1.5)	3 (1.5)	1 (0.5)		196 (100.0)	4	200	56.21	15.81
420～ (%)		3 (2.2)	9 (6.6)	27 (19.9)	38 (27.9)	23 (16.9)	19 (14.0)	11 (8.1)	4 (2.9)	1 (0.7)			136 (100.0)	3	139	59.44	17.03
480～ (%)		2 (4.8)	2 (4.8)	8 (19.0)	11 (26.2)	10 (23.8)	3 (7.1)	5 (11.9)	1 (2.4)				42 (100.0)	1	43	58.62	15.27
500～ (%)			2 (3.7)	13 (24.1)	17 (31.5)	8 (14.8)	5 (9.3)	7 (13.0)	1 (1.9)	1 (1.9)			54 (100.0)		54	59.70	15.64
540～ (%)		7 (9.9)	4 (5.6)	14 (19.7)	15 (21.1)	17 (23.9)	7 (9.9)	1 (1.4)	1 (1.4)	5 (7.0)			71 (100.0)	2	73	57.32	19.39
600～ (%)			8 (7.7)	21 (20.2)	36 (34.6)	22 (21.2)	7 (6.7)	5 (4.8)	1 (1.0)	2 (1.9)	1 (1.0)	1 (1.0)	104 (100.0)	1	105	58.54	16.49
800～ (%)		3 (2.8)	12 (11.0)	21 (19.3)	26 (23.9)	23 (21.1)	13 (11.9)	5 (4.6)	4 (3.7)	1 (0.9)	1 (0.9)		109 (100.0)	1	110	57.69	17.51
合計 (%)	19 (0.4)	132 (2.9)	472 (10.3)	1,067 (23.3)	1,274 (27.9)	883 (19.3)	421 (9.2)	195 (4.3)	67 (1.5)	33 (0.7)	6 (0.1)	4 (0.1)	4,573 (100.0)	55	4,628	55.25	15.51
記載なし (%)	2 (1.0)	10 (5.2)	32 (16.5)	43 (22.2)	33 (17.0)	45 (23.2)	16 (8.2)	6 (3.1)	6 (3.1)			1 (0.5)	194 (100.0)	182	376	53.32	17.53
総計 (%)	21 (0.4)	142 (3.0)	504 (10.6)	1,110 (23.3)	1,307 (27.4)	928 (19.5)	437 (9.2)	201 (4.2)	73 (1.5)	33 (0.7)	6 (0.1)	5 (0.1)	4,767 (100.0)	237	5,004	55.17	15.60
平均	160.42	209.17	203.48	213.23	219.32	230.70	233.51	258.00	316.55	372.30	540.00	400.00	223.99	214.75	223.88		
標準偏差	97.08	223.66	215.96	207.47	212.83	239.04	208.02	235.04	546.44	419.12	578.11	239.86	229.82	183.03	229.31		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査