

表 2935 BUN(mg/dL) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (100.0)									1 (100.0)		1	44.00	
20～ (%)			3 (20.0)	3 (20.0)	4 (26.7)	3 (20.0)	2 (13.3)						15 (100.0)		15	53.07	13.96
40～ (%)	4 (1.1)	13 (3.6)	46 (12.8)	94 (26.3)	93 (26.0)	70 (19.6)	19 (5.3)	13 (3.6)	4 (1.1)		1 (0.3)	1 (0.3)	358 (100.0)	17	375	52.67	15.58
60～ (%)	7 (0.3)	76 (3.8)	239 (11.8)	484 (24.0)	559 (27.7)	369 (18.3)	171 (8.5)	65 (3.2)	31 (1.5)	11 (0.5)	3 (0.1)	2 (0.1)	2,017 (100.0)	48	2,065	53.95	15.30
80～ (%)	2 (0.2)	33 (2.6)	135 (10.7)	305 (24.1)	331 (26.1)	259 (20.4)	130 (10.3)	46 (3.6)	16 (1.3)	10 (0.8)			1,267 (100.0)	29	1,296	55.16	14.75
90～ (%)		15 (2.1)	73 (10.4)	129 (18.3)	194 (27.6)	158 (22.5)	69 (9.8)	54 (7.7)	7 (1.0)	4 (0.6)			703 (100.0)	11	714	57.15	14.90
100～ (%)	1 (0.3)	4 (1.2)	21 (6.1)	91 (26.6)	84 (24.6)	65 (19.0)	42 (12.3)	19 (5.6)	9 (2.6)	5 (1.5)		1 (0.3)	342 (100.0)	5	347	58.00	15.93
120～ (%)			3 (16.7)	3 (16.7)	6 (33.3)	2 (11.1)	2 (11.1)	2 (11.1)					18 (100.0)		18	56.61	14.79
140～ (%)				1 (100.0)									1 (100.0)		1	40.00	
合計 (%)	14 (0.3)	141 (3.0)	520 (11.0)	1,111 (23.5)	1,271 (26.9)	926 (19.6)	435 (9.2)	199 (4.2)	67 (1.4)	30 (0.6)	4 (0.1)	4 (0.1)	4,722 (100.0)	110	4,832	54.95	15.22
記載なし (%)	15 (1.2)	42 (3.3)	152 (12.1)	281 (22.4)	342 (27.3)	224 (17.9)	114 (9.1)	46 (3.7)	22 (1.8)	10 (0.8)	3 (0.2)	3 (0.2)	1,254 (100.0)	2,855	4,109	54.73	17.91
総計 (%)	29 (0.5)	183 (3.1)	672 (11.2)	1,392 (23.3)	1,613 (27.0)	1,150 (19.2)	549 (9.2)	245 (4.1)	89 (1.5)	40 (0.7)	7 (0.1)	7 (0.1)	5,976 (100.0)	2,965	8,941	54.90	15.82
平均	68.43	75.27	77.21	78.22	79.08	79.73	81.47	83.39	79.69	83.63	65.50	71.25	79.07	76.38	79.01		
標準偏差	14.81	13.61	14.32	14.80	14.01	14.09	14.12	15.36	15.45	15.14	11.73	21.33	14.43	14.27	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査