

表 2939 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)														
2年～ (%)	57 (0.1)	858 (1.5)	3,542 (6.2)	10,079 (17.8)	16,194 (28.6)	14,042 (24.8)	7,859 (13.9)	3,018 (5.3)	1,069 (1.9)	56,718 (100.0)	1,571	58,289	9.78	2.83
5年～ (%)	12 (0.0)	469 (0.8)	2,349 (4.1)	7,360 (12.8)	15,064 (26.1)	16,238 (28.2)	10,262 (17.8)	4,348 (7.5)	1,568 (2.7)	57,670 (100.0)	1,557	59,227	10.44	2.81
10年～ (%)	4 (0.0)	167 (0.6)	968 (3.3)	3,244 (11.1)	7,170 (24.5)	8,540 (29.2)	5,894 (20.1)	2,427 (8.3)	851 (2.9)	29,265 (100.0)	767	30,032	10.69	2.70
15年～ (%)	1 (0.0)	83 (0.6)	408 (2.7)	1,459 (9.8)	3,552 (23.9)	4,616 (31.0)	3,074 (20.7)	1,294 (8.7)	386 (2.6)	14,873 (100.0)	376	15,249	10.80	2.65
20年～ (%)		34 (0.4)	224 (2.9)	777 (10.0)	1,884 (24.3)	2,481 (32.0)	1,546 (20.0)	624 (8.1)	177 (2.3)	7,747 (100.0)	184	7,931	10.73	2.62
25年～ (%)		15 (0.4)	126 (3.2)	464 (11.8)	1,122 (28.4)	1,219 (30.9)	733 (18.6)	226 (5.7)	40 (1.0)	3,945 (100.0)	99	4,044	10.35	2.40
30年～ (%)		15 (0.7)	92 (4.3)	323 (15.1)	718 (33.6)	601 (28.1)	301 (14.1)	80 (3.7)	9 (0.4)	2,139 (100.0)	44	2,183	9.82	2.38
35年～ (%)	2 (0.2)	10 (1.0)	63 (6.3)	233 (23.3)	338 (33.8)	258 (25.8)	79 (7.9)	18 (1.8)		1,001 (100.0)	32	1,033	9.09	2.24
40年～ (%)		5 (2.3)	23 (10.7)	67 (31.3)	73 (34.1)	39 (18.2)	6 (2.8)	1 (0.5)		214 (100.0)	7	221	8.26	2.09
合計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	5.04	6.63	7.45	7.95	8.68	9.28	9.39	9.28	8.65	8.83	8.58	8.83		
標準偏差	6.15	6.32	6.87	7.18	7.18	6.98	6.62	6.24	5.53	6.94	6.82	6.94		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査