

表 2944 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) equilibrated Kt/V(eKt/V)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	4 (3.0)	10 (7.5)	14 (10.4)	24 (17.9)	23 (17.2)	23 (17.2)	19 (14.2)	10 (7.5)	7 (5.2)	134 (100.0)		134	9.65	5.61
0.4～ (%)	5 (1.4)	34 (9.3)	58 (15.8)	74 (20.2)	66 (18.0)	59 (16.1)	39 (10.7)	23 (6.3)	8 (2.2)	366 (100.0)		366	8.71	4.10
0.6～ (%)	8 (0.3)	119 (4.2)	329 (11.6)	508 (17.9)	627 (22.1)	558 (19.7)	355 (12.5)	208 (7.3)	126 (4.4)	2,838 (100.0)		2,838	9.61	3.54
0.8～ (%)	14 (0.1)	299 (2.0)	1,023 (6.8)	2,247 (14.9)	3,354 (22.3)	3,428 (22.8)	2,584 (17.2)	1,374 (9.1)	717 (4.8)	15,040 (100.0)		15,040	10.36	3.30
1.0～ (%)	16 (0.0)	391 (0.9)	1,643 (3.9)	4,941 (11.7)	9,298 (21.9)	11,162 (26.3)	8,778 (20.7)	4,447 (10.5)	1,719 (4.1)	42,395 (100.0)		42,395	10.83	2.97
1.2～ (%)	7 (0.0)	297 (0.6)	1,772 (3.4)	6,302 (12.2)	13,473 (26.0)	15,212 (29.4)	9,897 (19.1)	3,831 (7.4)	977 (1.9)	51,768 (100.0)		51,768	10.49	2.63
1.4～ (%)	7 (0.0)	182 (0.6)	1,212 (3.9)	4,601 (14.7)	9,703 (31.0)	9,484 (30.3)	4,710 (15.0)	1,207 (3.9)	217 (0.7)	31,323 (100.0)		31,323	9.96	2.38
1.6～ (%)	4 (0.0)	78 (0.6)	579 (4.4)	2,332 (17.7)	4,592 (34.8)	3,868 (29.3)	1,432 (10.9)	261 (2.0)	51 (0.4)	13,197 (100.0)		13,197	9.56	2.24
1.8～ (%)	1 (0.0)	34 (0.8)	239 (5.5)	869 (19.9)	1,591 (36.3)	1,205 (27.5)	367 (8.4)	56 (1.3)	15 (0.3)	4,377 (100.0)		4,377	9.29	2.22
2.0～ (%)		21 (0.8)	151 (6.1)	499 (20.1)	911 (36.6)	658 (26.4)	197 (7.9)	37 (1.5)	14 (0.6)	2,488 (100.0)		2,488	9.27	2.44
合計 (%)	66 (0.0)	1,465 (0.9)	7,020 (4.3)	22,397 (13.7)	43,638 (26.6)	45,657 (27.9)	28,378 (17.3)	11,454 (7.0)	3,851 (2.3)	163,926 (100.0)		163,926	10.32	2.77
記載なし (%)	10 (0.1)	191 (2.0)	775 (8.0)	1,609 (16.7)	2,477 (25.7)	2,377 (24.6)	1,376 (14.3)	582 (6.0)	249 (2.6)	9,646 (100.0)	4,637	14,283	9.81	3.04
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	1.03	1.16	1.26	1.32	1.34	1.31	1.25	1.19	1.13	1.29		1.29		
標準偏差	0.37	0.33	0.32	0.30	0.28	0.26	0.23	0.21	0.21	0.27		0.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査