

表 2947 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前アルブミン濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)		19 (26.0)	25 (34.2)	15 (20.5)	5 (6.8)	5 (6.8)	3 (4.1)	1 (1.4)		73 (100.0)		73	5.98	2.76
1.5～ (%)	1 (0.2)	83 (17.6)	183 (38.8)	145 (30.7)	41 (8.7)	11 (2.3)	4 (0.8)	1 (0.2)	3 (0.6)	472 (100.0)	2	474	5.91	2.76
2.0～ (%)	7 (0.3)	266 (12.8)	759 (36.5)	641 (30.8)	283 (13.6)	95 (4.6)	19 (0.9)	4 (0.2)	8 (0.4)	2,082 (100.0)	12	2,094	6.32	2.72
2.5～ (%)	13 (0.1)	414 (4.8)	1,874 (21.6)	2,840 (32.7)	2,234 (25.7)	972 (11.2)	257 (3.0)	58 (0.7)	14 (0.2)	8,676 (100.0)	20	8,696	7.56	2.48
3.0～ (%)	21 (0.1)	433 (1.1)	2,691 (6.7)	8,488 (21.2)	13,018 (32.6)	9,683 (24.2)	4,252 (10.6)	1,101 (2.8)	265 (0.7)	39,952 (100.0)	54	40,006	9.32	2.49
3.5～ (%)	22 (0.0)	294 (0.3)	1,744 (2.1)	9,236 (10.9)	22,962 (27.1)	26,281 (31.0)	16,199 (19.1)	6,162 (7.3)	1,865 (2.2)	84,765 (100.0)	129	84,894	10.63	2.52
4.0～ (%)	9 (0.0)	108 (0.3)	351 (1.1)	2,061 (6.4)	6,364 (19.8)	9,503 (29.6)	7,915 (24.7)	4,104 (12.8)	1,665 (5.2)	32,080 (100.0)	38	32,118	11.55	2.68
4.5～ (%)	1 (0.1)	7 (0.4)	17 (0.9)	86 (4.7)	245 (13.3)	484 (26.3)	491 (26.7)	322 (17.5)	189 (10.3)	1,842 (100.0)	5	1,847	12.28	2.81
5.0～ (%)			5 (4.1)	19 (15.6)	20 (16.4)	30 (24.6)	25 (20.5)	14 (11.5)	9 (7.4)	122 (100.0)		122	11.17	3.35
合計 (%)	74 (0.0)	1,624 (1.0)	7,649 (4.5)	23,531 (13.8)	45,172 (26.6)	47,064 (27.7)	29,165 (17.1)	11,767 (6.9)	4,018 (2.4)	170,064 (100.0)	260	170,324	10.29	2.79
記載なし (%)	2 (0.1)	32 (0.9)	146 (4.2)	475 (13.5)	943 (26.9)	970 (27.7)	589 (16.8)	269 (7.7)	82 (2.3)	3,508 (100.0)	4,377	7,885	10.35	2.77
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	3.30	2.97	3.10	3.39	3.57	3.68	3.77	3.85	3.92	3.61	3.54	3.61		
標準偏差	0.59	0.66	0.56	0.46	0.38	0.35	0.33	0.32	0.34	0.43	0.52	0.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査