

表 2955 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

HDL-C濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (0.2)	22 (4.3)	109 (21.3)	90 (17.6)	106 (20.7)	94 (18.4)	49 (9.6)	30 (5.9)	11 (2.1)	512 (100.0)	2	514	8.81	3.59
20～ (%)	2 (0.0)	129 (1.3)	576 (5.8)	1,319 (13.3)	2,197 (22.1)	2,526 (25.5)	1,933 (19.5)	853 (8.6)	388 (3.9)	9,923 (100.0)	10	9,933	10.52	3.08
30～ (%)	13 (0.0)	273 (1.0)	1,363 (4.8)	3,686 (13.0)	7,036 (24.7)	7,570 (26.6)	5,192 (18.3)	2,401 (8.4)	910 (3.2)	28,444 (100.0)	34	28,478	10.48	2.92
40～ (%)	14 (0.0)	272 (0.9)	1,298 (4.1)	4,450 (14.0)	8,594 (27.1)	8,662 (27.3)	5,526 (17.4)	2,208 (7.0)	721 (2.3)	31,745 (100.0)	33	31,778	10.31	2.74
50～ (%)	4 (0.0)	167 (0.7)	828 (3.6)	3,157 (13.8)	6,445 (28.2)	6,594 (28.8)	3,772 (16.5)	1,499 (6.6)	409 (1.8)	22,875 (100.0)	30	22,905	10.26	2.64
60～ (%)	5 (0.0)	93 (0.7)	470 (3.5)	1,691 (12.8)	3,778 (28.5)	3,986 (30.1)	2,246 (16.9)	790 (6.0)	201 (1.5)	13,260 (100.0)	18	13,278	10.28	2.56
70～ (%)	2 (0.0)	34 (0.5)	209 (3.2)	875 (13.3)	1,849 (28.2)	2,081 (31.7)	1,075 (16.4)	363 (5.5)	79 (1.2)	6,567 (100.0)	8	6,575	10.24	2.44
80～ (%)	4 (0.1)	16 (0.5)	95 (3.0)	368 (11.8)	933 (29.9)	973 (31.2)	525 (16.8)	165 (5.3)	43 (1.4)	3,122 (100.0)	3	3,125	10.25	2.44
90～ (%)		10 (0.7)	45 (3.2)	182 (13.0)	407 (29.0)	438 (31.2)	240 (17.1)	61 (4.3)	22 (1.6)	1,405 (100.0)	3	1,408	10.25	2.53
100～ (%)	1 (0.1)	10 (0.9)	41 (3.5)	148 (12.8)	330 (28.5)	375 (32.4)	185 (16.0)	54 (4.7)	15 (1.3)	1,159 (100.0)	2	1,161	10.16	2.43
合計 (%)	46 (0.0)	1,026 (0.9)	5,034 (4.2)	15,966 (13.4)	31,675 (26.6)	33,299 (28.0)	20,743 (17.4)	8,424 (7.1)	2,799 (2.4)	119,012 (100.0)	143	119,155	10.34	2.76
記載なし (%)	30 (0.1)	630 (1.2)	2,761 (5.1)	8,040 (14.7)	14,440 (26.5)	14,735 (27.0)	9,011 (16.5)	3,612 (6.6)	1,301 (2.4)	54,560 (100.0)	4,494	59,054	10.19	2.85
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	50.11	44.96	45.33	48.28	49.52	49.52	47.81	46.03	43.59	48.45	49.61	48.46		
標準偏差	19.90	16.50	16.56	16.46	16.63	17.00	16.39	15.37	15.08	16.61	18.43	16.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査