

表 2957 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前収縮 期血圧	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)			4 (15.4)	7 (26.9)	8 (30.8)	4 (15.4)	3 (11.5)			26 (100.0)		26	8.58	2.36
60～ (%)	1 (0.4)	6 (2.6)	27 (11.7)	58 (25.2)	64 (27.8)	47 (20.4)	21 (9.1)	6 (2.6)		230 (100.0)	3	233	8.72	2.64
80～ (%)	2 (0.1)	55 (2.9)	169 (8.9)	413 (21.6)	531 (27.8)	405 (21.2)	221 (11.6)	86 (4.5)	26 (1.4)	1,908 (100.0)	15	1,923	9.31	2.97
100～ (%)	8 (0.1)	180 (1.8)	738 (7.4)	1,757 (17.7)	2,658 (26.7)	2,464 (24.8)	1,417 (14.2)	545 (5.5)	186 (1.9)	9,953 (100.0)	90	10,043	9.74	2.91
120～ (%)	21 (0.1)	392 (1.2)	1,614 (5.1)	4,464 (14.2)	8,359 (26.5)	8,482 (26.9)	5,281 (16.7)	2,183 (6.9)	740 (2.3)	31,536 (100.0)	214	31,750	10.20	2.85
140～ (%)	18 (0.0)	422 (0.9)	1,997 (4.0)	6,492 (13.1)	13,128 (26.4)	14,085 (28.4)	8,750 (17.6)	3,519 (7.1)	1,236 (2.5)	49,647 (100.0)	251	49,898	10.38	2.74
160～ (%)	8 (0.0)	263 (0.7)	1,423 (3.9)	4,770 (13.0)	9,763 (26.5)	10,452 (28.4)	6,591 (17.9)	2,644 (7.2)	861 (2.3)	36,775 (100.0)	167	36,942	10.41	2.70
180～ (%)	1 (0.0)	99 (0.7)	533 (3.8)	1,952 (13.8)	3,880 (27.4)	3,984 (28.1)	2,437 (17.2)	966 (6.8)	308 (2.2)	14,160 (100.0)	58	14,218	10.33	2.73
200～ (%)		18 (0.5)	145 (4.0)	461 (12.9)	1,004 (28.0)	1,055 (29.4)	603 (16.8)	227 (6.3)	72 (2.0)	3,585 (100.0)	18	3,603	10.32	2.70
220～ (%)		3 (0.4)	25 (3.5)	105 (14.6)	206 (28.7)	202 (28.2)	115 (16.0)	46 (6.4)	15 (2.1)	717 (100.0)	6	723	10.28	2.66
合計 (%)	59 (0.0)	1,438 (1.0)	6,675 (4.5)	20,479 (13.8)	39,601 (26.7)	41,180 (27.7)	25,439 (17.1)	10,222 (6.9)	3,444 (2.3)	148,537 (100.0)	822	149,359	10.28	2.78
記載なし (%)	17 (0.1)	218 (0.9)	1,120 (4.5)	3,527 (14.1)	6,514 (26.0)	6,854 (27.4)	4,315 (17.2)	1,814 (7.2)	656 (2.6)	25,035 (100.0)	3,815	28,850	10.34	2.85
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	136.29	143.56	147.00	150.22	152.08	152.82	152.99	152.83	152.31	151.92	146.95	151.90		
標準偏差	21.86	25.32	26.03	25.45	24.36	23.60	23.14	22.83	22.41	24.10	25.72	24.11		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査