

表 2958 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前拡張 期血圧	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (1.8)	2 (3.6)	9 (16.4)	14 (25.5)	17 (30.9)	9 (16.4)	3 (5.5)		55 (100.0)		55	10.04	2.72
20～ (%)		19 (3.7)	53 (10.3)	129 (25.0)	157 (30.4)	104 (20.1)	43 (8.3)	10 (1.9)	2 (0.4)	517 (100.0)	7	524	8.74	3.00
40～ (%)	9 (0.1)	243 (2.0)	1,074 (8.6)	2,769 (22.2)	4,037 (32.4)	2,757 (22.1)	1,182 (9.5)	301 (2.4)	75 (0.6)	12,447 (100.0)	108	12,555	9.06	2.54
60～ (%)	35 (0.1)	747 (1.1)	3,515 (5.1)	10,859 (15.8)	20,017 (29.2)	18,947 (27.6)	10,061 (14.7)	3,402 (5.0)	956 (1.4)	68,539 (100.0)	402	68,941	9.92	2.65
80～ (%)	11 (0.0)	251 (0.7)	1,194 (3.3)	4,082 (11.2)	8,949 (24.6)	10,897 (29.9)	7,211 (19.8)	2,908 (8.0)	944 (2.6)	36,447 (100.0)	183	36,630	10.64	2.69
90～ (%)	4 (0.0)	120 (0.6)	537 (2.7)	1,772 (9.0)	4,387 (22.2)	5,555 (28.1)	4,441 (22.4)	2,139 (10.8)	838 (4.2)	19,793 (100.0)	70	19,863	11.09	2.81
100～ (%)		47 (0.5)	249 (2.6)	756 (7.8)	1,819 (18.8)	2,623 (27.1)	2,257 (23.3)	1,354 (14.0)	578 (6.0)	9,683 (100.0)	48	9,731	11.50	2.97
120～ (%)		4 (0.7)	14 (2.4)	31 (5.2)	95 (16.0)	164 (27.7)	168 (28.4)	76 (12.8)	40 (6.8)	592 (100.0)	2	594	11.78	2.78
140～ (%)			1 (2.4)	7 (17.1)	9 (22.0)	14 (34.1)	8 (19.5)	1 (2.4)	1 (2.4)	41 (100.0)	2	43	10.33	2.35
合計 (%)	59 (0.0)	1,432 (1.0)	6,639 (4.5)	20,414 (13.8)	39,484 (26.7)	41,078 (27.7)	25,380 (17.1)	10,194 (6.9)	3,434 (2.3)	148,114 (100.0)	822	148,936	10.29	2.78
記載なし (%)	17 (0.1)	224 (0.9)	1,156 (4.5)	3,592 (14.1)	6,631 (26.0)	6,956 (27.3)	4,374 (17.2)	1,842 (7.2)	666 (2.6)	25,458 (100.0)	3,815	29,273	10.33	2.85
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	70.07	71.84	72.41	73.47	75.69	78.45	81.25	84.09	86.58	77.75	75.06	77.73		
標準偏差	11.99	15.04	14.54	14.13	13.97	13.89	14.08	14.08	14.23	14.46	15.58	14.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査