

表 2961 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)						1 (100.0)				1 (100.0)		1	10.10	
15歳～ (%)			1 (0.8)	2 (1.7)	4 (3.4)	23 (19.5)	30 (25.4)	33 (28.0)	25 (21.2)	118 (100.0)	6	124	13.78	2.65
30歳～ (%)		3 (0.1)	10 (0.5)	32 (1.5)	160 (7.6)	400 (19.0)	606 (28.8)	516 (24.5)	380 (18.0)	2,107 (100.0)	29	2,136	13.43	2.68
45歳～ (%)		9 (0.1)	45 (0.6)	335 (4.2)	1,159 (14.5)	2,418 (30.2)	2,300 (28.7)	1,289 (16.1)	455 (5.7)	8,010 (100.0)	172	8,182	12.04	2.49
60歳～ (%)		53 (0.3)	362 (2.2)	1,672 (10.1)	4,596 (27.7)	5,650 (34.0)	3,213 (19.3)	900 (5.4)	171 (1.0)	16,617 (100.0)	346	16,963	10.51	2.29
75歳～ (%)	3 (0.0)	73 (1.0)	448 (6.3)	1,605 (22.6)	2,739 (38.6)	1,636 (23.1)	486 (6.9)	82 (1.2)	17 (0.2)	7,089 (100.0)	194	7,283	8.99	2.15
90歳～ (%)		9 (3.3)	52 (18.8)	104 (37.7)	89 (32.2)	19 (6.9)	3 (1.1)			276 (100.0)	6	282	7.39	1.92
合計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	84.67	74.93	74.98	72.68	69.32	64.48	59.79	54.46	48.94	64.73	66.05	64.76		
標準偏差	5.86	11.31	10.36	10.19	10.22	10.50	10.93	11.06	11.00	12.16	12.52	12.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査