

表 2962 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)														
2年～ (%)	3 (0.0)	83 (1.0)	386 (4.6)	1,272 (15.1)	2,233 (26.5)	2,260 (26.8)	1,386 (16.5)	576 (6.8)	223 (2.6)	8,422 (100.0)	193	8,615	10.22	2.79
5年～ (%)		39 (0.4)	266 (2.7)	1,031 (10.4)	2,468 (25.0)	2,811 (28.5)	1,991 (20.2)	903 (9.1)	360 (3.6)	9,869 (100.0)	247	10,116	10.85	2.72
10年～ (%)		10 (0.2)	120 (2.0)	484 (8.0)	1,431 (23.6)	1,849 (30.5)	1,308 (21.6)	629 (10.4)	232 (3.8)	6,063 (100.0)	131	6,194	11.12	2.62
15年～ (%)		5 (0.1)	36 (0.9)	321 (8.3)	862 (22.3)	1,234 (32.0)	911 (23.6)	354 (9.2)	135 (3.5)	3,858 (100.0)	66	3,924	11.17	2.49
20年～ (%)		3 (0.1)	25 (1.0)	178 (6.9)	642 (24.8)	893 (34.5)	549 (21.2)	223 (8.6)	72 (2.8)	2,585 (100.0)	52	2,637	11.06	2.37
25年～ (%)		2 (0.1)	22 (1.4)	163 (10.0)	479 (29.4)	541 (33.2)	319 (19.6)	82 (5.0)	20 (1.2)	1,628 (100.0)	23	1,651	10.55	2.27
30年～ (%)		3 (0.3)	24 (2.2)	145 (13.2)	357 (32.5)	384 (35.0)	134 (12.2)	45 (4.1)	5 (0.5)	1,097 (100.0)	26	1,123	10.04	2.12
35年～ (%)		1 (0.2)	31 (5.4)	121 (21.0)	225 (39.1)	153 (26.6)	37 (6.4)	6 (1.0)	1 (0.2)	575 (100.0)	12	587	9.23	2.04
40年～ (%)		1 (0.8)	8 (6.6)	35 (28.9)	50 (41.3)	22 (18.2)	3 (2.5)	2 (1.7)		121 (100.0)	3	124	8.58	1.93
合計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	3.00	6.66	8.96	10.72	11.79	11.94	11.29	10.70	9.99	11.38	10.74	11.36		
標準偏差	1.00	7.23	9.18	9.77	9.41	8.70	7.70	7.06	6.28	8.68	8.53	8.68		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査