

表 2963 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		37 (0.3)	206 (1.5)	1,100 (7.9)	3,224 (23.3)	4,324 (31.2)	3,018 (21.8)	1,401 (10.1)	544 (3.9)	13,854 (100.0)	272	14,126	11.14	2.59
慢性腎盂腎炎 (%)			11 (2.8)	43 (11.1)	104 (26.8)	113 (29.1)	77 (19.8)	32 (8.2)	8 (2.1)	388 (100.0)	10	398	10.71	2.53
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		2 (0.8)	9 (3.6)	24 (9.6)	62 (24.9)	78 (31.3)	49 (19.7)	18 (7.2)	7 (2.8)	249 (100.0)	1	250	10.68	2.74
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			3 (0.9)	43 (12.5)	134 (39.0)	118 (34.3)	40 (11.6)	6 (1.7)		344 (100.0)	4	348	9.95	1.76
その他の分類不 能の腎炎 (%)			4 (2.2)	11 (6.0)	33 (18.0)	55 (30.1)	44 (24.0)	26 (14.2)	10 (5.5)	183 (100.0)	3	186	11.66	2.68
多発性嚢胞腎 (%)			25 (1.9)	110 (8.5)	328 (25.3)	416 (32.0)	276 (21.3)	114 (8.8)	29 (2.2)	1,298 (100.0)	32	1,330	10.92	2.43
腎硬化症 (%)	1 (0.0)	12 (0.5)	68 (3.1)	306 (13.8)	606 (27.2)	635 (28.5)	379 (17.0)	151 (6.8)	67 (3.0)	2,225 (100.0)	27	2,252	10.41	2.68
悪性高血圧 (%)		2 (0.8)	12 (4.5)	14 (5.3)	49 (18.5)	70 (26.4)	69 (26.0)	33 (12.5)	16 (6.0)	265 (100.0)	5	270	11.49	3.04
糖尿病性腎症 (%)	1 (0.0)	71 (0.7)	445 (4.2)	1,553 (14.7)	3,040 (28.7)	2,974 (28.1)	1,721 (16.2)	629 (5.9)	157 (1.5)	10,591 (100.0)	254	10,845	10.15	2.59
SLE腎炎 (%)		1 (0.3)	9 (2.7)	60 (18.2)	95 (28.8)	92 (27.9)	53 (16.1)	13 (3.9)	7 (2.1)	330 (100.0)	7	337	10.11	2.55
アミロイド腎 (%)			3 (7.0)	6 (14.0)	14 (32.6)	13 (30.2)	3 (7.0)	4 (9.3)		43 (100.0)		43	9.68	2.51
痛風腎 (%)				12 (8.8)	26 (19.1)	35 (25.7)	39 (28.7)	12 (8.8)	12 (8.8)	136 (100.0)	6	142	11.70	2.84
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				2 (5.3)	5 (13.2)	13 (34.2)	14 (36.8)	3 (7.9)	1 (2.6)	38 (100.0)	3	41	11.79	2.01
腎・尿路結核 (%)				5 (26.3)	8 (42.1)	3 (15.8)	2 (10.5)	1 (5.3)		19 (100.0)	1	20	9.42	2.27
腎・尿路結石 (%)		1 (1.6)	2 (3.2)	5 (7.9)	21 (33.3)	20 (31.7)	10 (15.9)	2 (3.2)	2 (3.2)	63 (100.0)	1	64	10.33	2.59
腎・尿路腫瘍 (%)			2 (3.2)	5 (8.1)	14 (22.6)	25 (40.3)	11 (17.7)	3 (4.8)	2 (3.2)	62 (100.0)		62	10.73	2.46
閉塞性尿路障害 (%)				4 (6.1)	12 (18.2)	24 (36.4)	15 (22.7)	9 (13.6)	2 (3.0)	66 (100.0)	3	69	11.55	2.65
骨髄腫 (%)		1 (9.1)	1 (9.1)	2 (18.2)	1 (9.1)	4 (36.4)	1 (9.1)	1 (9.1)		11 (100.0)		11	9.39	3.53
腎形成不全 (%)		1 (1.1)		3 (3.2)	9 (9.7)	15 (16.1)	34 (36.6)	16 (17.2)	15 (16.1)	93 (100.0)	2	95	13.02	2.79
不明 (%)	1 (0.0)	13 (0.5)	93 (3.3)	341 (12.0)	738 (25.9)	792 (27.8)	528 (18.6)	241 (8.5)	99 (3.5)	2,846 (100.0)	108	2,954	10.67	2.80
再導入 (%)			5 (1.3)	17 (4.5)	62 (16.4)	121 (32.0)	98 (25.9)	46 (12.2)	29 (7.7)	378 (100.0)	7	385	11.84	2.60
その他 (%)		6 (0.8)	20 (2.7)	84 (11.4)	162 (22.0)	207 (28.1)	157 (21.3)	59 (8.0)	41 (5.6)	736 (100.0)	7	743	10.92	2.93
合計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
記載なし (%)														
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査