

表 2964 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学			8	8	3	8	8	2		37		37	9.19	3.11
(%)			(21.6)	(21.6)	(8.1)	(21.6)	(21.6)	(5.4)		(100.0)				
私立大学			2	22	50	46	22	7	1	150	1	151	10.14	2.32
(%)			(1.3)	(14.7)	(33.3)	(30.7)	(14.7)	(4.7)	(0.7)	(100.0)				
国立	1	1	5	7	5	9		2	2	32		32	8.92	3.83
(%)	(3.1)	(3.1)	(15.6)	(21.9)	(15.6)	(28.1)		(6.3)	(6.3)	(100.0)				
県市町村立		3	35	165	380	437	310	120	48	1,498	41	1,539	10.77	2.63
(%)		(0.2)	(2.3)	(11.0)	(25.4)	(29.2)	(20.7)	(8.0)	(3.2)	(100.0)				
社会保険		1	5	31	88	86	44	20	7	282	9	291	10.53	2.55
(%)		(0.4)	(1.8)	(11.0)	(31.2)	(30.5)	(15.6)	(7.1)	(2.5)	(100.0)				
厚生連		8	18	98	228	259	164	69	23	867	38	905	10.64	2.63
(%)		(0.9)	(2.1)	(11.3)	(26.3)	(29.9)	(18.9)	(8.0)	(2.7)	(100.0)				
その他公的		3	20	80	189	161	90	33	13	589	29	618	10.21	2.54
(%)		(0.5)	(3.4)	(13.6)	(32.1)	(27.3)	(15.3)	(5.6)	(2.2)	(100.0)				
私立総合		4	37	97	234	301	166	73	32	944	11	955	10.62	2.67
(%)		(0.4)	(3.9)	(10.3)	(24.8)	(31.9)	(17.6)	(7.7)	(3.4)	(100.0)				
私立		61	331	1,047	2,177	2,404	1,575	674	252	8,521	305	8,826	10.55	2.75
(%)		(0.7)	(3.9)	(12.3)	(25.5)	(28.2)	(18.5)	(7.9)	(3.0)	(100.0)				
私立診療所	2	66	457	2,195	5,393	6,436	4,259	1,820	670	21,298	319	21,617	10.82	2.62
(%)	(0.0)	(0.3)	(2.1)	(10.3)	(25.3)	(30.2)	(20.0)	(8.5)	(3.1)	(100.0)				
総計	3	147	918	3,750	8,747	10,147	6,638	2,820	1,048	34,218	753	34,971	10.72	2.66
(%)	(0.0)	(0.4)	(2.7)	(11.0)	(25.6)	(29.7)	(19.4)	(8.2)	(3.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査