

表 2965 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					3 (27.3)	3 (27.3)	2 (18.2)	2 (18.2)	1 (9.1)	11 (100.0)		11	12.18	2.56
20～ (%)	1 (1.6)	3 (4.7)	19 (29.7)	18 (28.1)	12 (18.8)	7 (10.9)	4 (6.3)			64 (100.0)	3	67	7.33	2.50
30～ (%)	2 (0.1)	45 (1.9)	244 (10.2)	720 (30.2)	872 (36.6)	424 (17.8)	58 (2.4)	11 (0.5)	5 (0.2)	2,381 (100.0)	15	2,396	8.31	2.09
40～ (%)		50 (0.6)	359 (4.0)	1,488 (16.7)	3,243 (36.4)	2,720 (30.6)	879 (9.9)	142 (1.6)	20 (0.2)	8,901 (100.0)	52	8,953	9.54	2.12
50～ (%)		28 (0.3)	198 (1.8)	990 (9.0)	2,830 (25.8)	3,705 (33.8)	2,326 (21.2)	711 (6.5)	175 (1.6)	10,963 (100.0)	45	11,008	10.72	2.33
60～ (%)		15 (0.2)	65 (0.9)	374 (5.2)	1,214 (16.9)	2,191 (30.4)	2,015 (28.0)	983 (13.6)	347 (4.8)	7,204 (100.0)	27	7,231	11.75	2.52
70～ (%)		3 (0.1)	20 (0.7)	91 (3.1)	352 (12.1)	716 (24.7)	857 (29.6)	583 (20.1)	278 (9.6)	2,900 (100.0)	10	2,910	12.55	2.62
80～ (%)		1 (0.1)	4 (0.4)	33 (3.1)	124 (11.6)	239 (22.4)	313 (29.3)	229 (21.4)	126 (11.8)	1,069 (100.0)	4	1,073	12.78	2.68
90～ (%)				8 (2.2)	43 (11.6)	69 (18.6)	102 (27.6)	92 (24.9)	56 (15.1)	370 (100.0)	1	371	13.19	2.73
100～ (%)			1 (0.9)		5 (4.6)	19 (17.4)	34 (31.2)	31 (28.4)	19 (17.4)	109 (100.0)		109	13.89	2.76
110～ (%)					2 (4.3)	8 (17.4)	12 (26.1)	16 (34.8)	8 (17.4)	46 (100.0)		46	13.92	2.39
120～ (%)					2 (6.5)	4 (12.9)	10 (32.3)	8 (25.8)	7 (22.6)	31 (100.0)		31	14.02	2.79
合計 (%)	3 (0.0)	145 (0.4)	910 (2.7)	3,722 (10.9)	8,702 (25.6)	10,105 (29.7)	6,612 (19.4)	2,808 (8.2)	1,042 (3.1)	34,049 (100.0)	157	34,206	10.72	2.66
記載なし (%)		2 (1.2)	8 (4.7)	28 (16.6)	45 (26.6)	42 (24.9)	26 (15.4)	12 (7.1)	6 (3.6)	169 (100.0)	596	765	10.17	2.85
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	33.73	46.23	46.34	48.81	52.01	56.13	61.54	66.88	71.05	56.37	52.91	56.35		
標準偏差	5.21	11.35	10.26	10.33	10.85	11.34	12.00	13.00	13.69	12.89	12.12	12.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査