

表 2966 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			1 (5.3)	5 (26.3)	5 (26.3)	5 (26.3)	2 (10.5)	1 (5.3)		19 (100.0)		19	9.53	2.55
0.4～ (%)			3 (15.8)	2 (10.5)	6 (31.6)	2 (10.5)	4 (21.1)	1 (5.3)	1 (5.3)	19 (100.0)		19	10.02	3.54
0.6～ (%)		3 (3.6)	12 (14.3)	13 (15.5)	17 (20.2)	15 (17.9)	13 (15.5)	6 (7.1)	5 (6.0)	84 (100.0)		84	9.86	3.83
0.8～ (%)		8 (1.3)	36 (5.8)	92 (14.9)	109 (17.6)	124 (20.1)	121 (19.6)	84 (13.6)	44 (7.1)	618 (100.0)		618	10.96	3.45
1.0～ (%)		29 (1.0)	84 (2.9)	256 (8.8)	516 (17.7)	713 (24.5)	634 (21.7)	430 (14.7)	254 (8.7)	2,916 (100.0)		2,916	11.58	3.18
1.2～ (%)	3 (0.0)	32 (0.4)	187 (2.5)	617 (8.2)	1,502 (20.0)	2,013 (26.8)	1,771 (23.6)	993 (13.2)	388 (5.2)	7,506 (100.0)		7,506	11.37	2.84
1.4～ (%)		27 (0.3)	196 (2.2)	874 (9.7)	2,175 (24.2)	2,703 (30.1)	1,991 (22.2)	776 (8.6)	230 (2.6)	8,972 (100.0)		8,972	10.86	2.55
1.6～ (%)		17 (0.3)	163 (2.4)	780 (11.7)	1,939 (29.1)	2,201 (33.0)	1,174 (17.6)	332 (5.0)	67 (1.0)	6,673 (100.0)		6,673	10.36	2.32
1.8～ (%)		10 (0.3)	102 (2.9)	500 (14.1)	1,140 (32.2)	1,210 (34.2)	484 (13.7)	81 (2.3)	13 (0.4)	3,540 (100.0)		3,540	9.94	2.11
2.0～ (%)		8 (0.3)	69 (2.7)	404 (15.7)	971 (37.8)	833 (32.4)	243 (9.5)	33 (1.3)	7 (0.3)	2,568 (100.0)		2,568	9.65	2.05
合計 (%)	3 (0.0)	134 (0.4)	853 (2.6)	3,543 (10.8)	8,380 (25.5)	9,819 (29.8)	6,437 (19.6)	2,737 (8.3)	1,009 (3.1)	32,915 (100.0)		32,915	10.74	2.65
記載なし (%)		13 (1.0)	65 (5.0)	207 (15.9)	367 (28.2)	328 (25.2)	201 (15.4)	83 (6.4)	39 (3.0)	1,303 (100.0)	753	2,056	10.11	2.81
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	1.33	1.41	1.52	1.60	1.61	1.57	1.48	1.38	1.31	1.54		1.54		
標準偏差	0.05	0.37	0.35	0.35	0.33	0.30	0.26	0.23	0.22	0.31		0.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査