

表 2967 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) equilibrated Kt/V(eKt/V)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			1 (5.0)	6 (30.0)	5 (25.0)	5 (25.0)	2 (10.0)	1 (5.0)		20 (100.0)		20	9.43	2.52
0.4～ (%)		1 (2.3)	6 (13.6)	5 (11.4)	12 (27.3)	8 (18.2)	7 (15.9)	3 (6.8)	2 (4.5)	44 (100.0)		44	9.85	3.59
0.6～ (%)		7 (2.1)	32 (9.5)	62 (18.5)	71 (21.1)	61 (18.2)	61 (18.2)	25 (7.4)	17 (5.1)	336 (100.0)		336	10.05	3.41
0.8～ (%)		30 (1.4)	79 (3.6)	236 (10.7)	410 (18.5)	536 (24.2)	432 (19.5)	314 (14.2)	174 (7.9)	2,211 (100.0)		2,211	11.31	3.29
1.0～ (%)	3 (0.0)	32 (0.4)	198 (2.6)	633 (8.4)	1,505 (20.1)	1,931 (25.7)	1,747 (23.3)	1,009 (13.4)	444 (5.9)	7,502 (100.0)		7,502	11.40	2.91
1.2～ (%)		32 (0.3)	211 (2.1)	955 (9.4)	2,392 (23.6)	3,083 (30.4)	2,260 (22.3)	931 (9.2)	275 (2.7)	10,139 (100.0)		10,139	10.92	2.56
1.4～ (%)		17 (0.2)	179 (2.5)	822 (11.5)	2,089 (29.3)	2,363 (33.1)	1,239 (17.4)	344 (4.8)	77 (1.1)	7,130 (100.0)		7,130	10.35	2.29
1.6～ (%)		9 (0.3)	91 (2.7)	489 (14.5)	1,092 (32.4)	1,119 (33.2)	479 (14.2)	78 (2.3)	15 (0.4)	3,372 (100.0)		3,372	9.96	2.20
1.8～ (%)		3 (0.2)	31 (2.4)	195 (15.1)	465 (36.0)	432 (33.4)	140 (10.8)	23 (1.8)	3 (0.2)	1,292 (100.0)		1,292	9.78	2.04
2.0～ (%)		4 (0.4)	27 (3.0)	145 (16.3)	344 (38.7)	285 (32.0)	71 (8.0)	11 (1.2)	3 (0.3)	890 (100.0)		890	9.57	2.07
合計 (%)	3 (0.0)	135 (0.4)	855 (2.6)	3,548 (10.8)	8,385 (25.5)	9,823 (29.8)	6,438 (19.5)	2,739 (8.3)	1,010 (3.1)	32,936 (100.0)		32,936	10.74	2.65
記載なし (%)		12 (0.9)	63 (4.9)	202 (15.8)	362 (28.2)	324 (25.3)	200 (15.6)	81 (6.3)	38 (3.0)	1,282 (100.0)	753	2,035	10.12	2.80
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	1.12	1.22	1.32	1.39	1.41	1.38	1.30	1.21	1.15	1.35		1.35		
標準偏差	0.05	0.34	0.32	0.32	0.30	0.28	0.24	0.21	0.20	0.29		0.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査