

表 2969 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) %クレアチニン産生速度(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	2 (0.1)	134 (8.2)	699 (42.8)	673 (41.2)	117 (7.2)	8 (0.5)	1 (0.1)			1,634 (100.0)		1,634	5.93	1.43
60～ (%)			121 (8.6)	794 (56.6)	421 (30.0)	62 (4.4)	4 (0.3)	2 (0.1)		1,404 (100.0)		1,404	7.56	1.30
70～ (%)			27 (1.1)	955 (38.5)	1,152 (46.5)	310 (12.5)	33 (1.3)	1 (0.0)		2,478 (100.0)		2,478	8.44	1.36
80～ (%)			6 (0.2)	670 (17.3)	2,012 (52.0)	991 (25.6)	167 (4.3)	21 (0.5)	1 (0.0)	3,868 (100.0)		3,868	9.33	1.48
90～ (%)		1 (0.0)		332 (6.5)	2,059 (40.4)	2,039 (40.0)	564 (11.1)	101 (2.0)	4 (0.1)	5,100 (100.0)		5,100	10.18	1.60
100～ (%)				105 (1.8)	1,576 (27.0)	2,425 (41.6)	1,326 (22.7)	363 (6.2)	39 (0.7)	5,834 (100.0)		5,834	11.08	1.78
110～ (%)				17 (0.3)	763 (14.1)	2,058 (38.1)	1,786 (33.1)	634 (11.7)	141 (2.6)	5,399 (100.0)		5,399	11.94	1.85
120～ (%)				4 (0.1)	242 (6.3)	1,251 (32.6)	1,398 (36.4)	713 (18.6)	235 (6.1)	3,843 (100.0)		3,843	12.68	1.96
130～ (%)					45 (2.2)	541 (25.9)	739 (35.3)	517 (24.7)	250 (12.0)	2,092 (100.0)		2,092	13.37	2.08
140～ (%)			1 (0.1)	2 (0.2)	13 (1.0)	145 (11.1)	423 (32.3)	387 (29.6)	337 (25.8)	1,308 (100.0)		1,308	14.48	2.33
合計 (%)	2 (0.0)	135 (0.4)	854 (2.6)	3,552 (10.8)	8,400 (25.5)	9,830 (29.8)	6,441 (19.5)	2,739 (8.3)	1,007 (3.1)	32,960 (100.0)		32,960	10.74	2.64
記載なし (%)	1 (0.1)	12 (1.0)	64 (5.1)	198 (15.7)	347 (27.6)	317 (25.2)	197 (15.7)	81 (6.4)	41 (3.3)	1,258 (100.0)	753	2,011	10.18	3.02
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	4.75	24.98	48.33	73.32	92.64	106.55	116.77	124.21	135.45	101.92		101.92		
標準偏差	5.87	10.79	13.59	14.59	15.38	15.52	14.96	15.51	19.45	23.87		23.87		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査