

表 2971 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前CRP濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	1 (0.0)	45 (0.2)	306 (1.7)	1,618 (9.0)	4,395 (24.3)	5,660 (31.3)	3,830 (21.2)	1,629 (9.0)	591 (3.3)	18,075 (100.0)	6	18,081	10.98	2.55
0.2～ (%)	1 (0.0)	27 (0.5)	164 (2.9)	709 (12.4)	1,504 (26.3)	1,636 (28.6)	1,061 (18.5)	452 (7.9)	170 (3.0)	5,724 (100.0)	6	5,730	10.61	2.69
0.5～ (%)		14 (0.5)	90 (3.3)	362 (13.1)	786 (28.4)	764 (27.6)	481 (17.4)	190 (6.9)	81 (2.9)	2,768 (100.0)	2	2,770	10.42	2.68
1.0～ (%)		11 (0.6)	102 (5.8)	297 (16.8)	517 (29.3)	421 (23.9)	258 (14.6)	116 (6.6)	42 (2.4)	1,764 (100.0)	2	1,766	9.99	2.79
2.0～ (%)	1 (0.1)	20 (2.0)	81 (8.1)	196 (19.5)	296 (29.4)	230 (22.9)	108 (10.7)	53 (5.3)	21 (2.1)	1,006 (100.0)	1	1,007	9.50	2.88
4.0～ (%)		4 (1.1)	37 (10.4)	79 (22.3)	108 (30.4)	76 (21.4)	29 (8.2)	16 (4.5)	6 (1.7)	355 (100.0)		355	9.25	2.77
6.0～ (%)			17 (11.3)	35 (23.3)	46 (30.7)	30 (20.0)	16 (10.7)	4 (2.7)	2 (1.3)	150 (100.0)		150	9.11	2.80
8.0～ (%)		2 (2.4)	11 (12.9)	21 (24.7)	22 (25.9)	21 (24.7)	4 (4.7)	2 (2.4)	2 (2.4)	85 (100.0)		85	8.81	2.76
10.0～ (%)		4 (4.4)	4 (4.4)	23 (25.3)	23 (25.3)	20 (22.0)	11 (12.1)	5 (5.5)	1 (1.1)	91 (100.0)		91	9.28	2.91
15.0～ (%)			6 (8.0)	24 (32.0)	22 (29.3)	17 (22.7)	4 (5.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	75 (100.0)		75	8.90	2.47
合計 (%)	3 (0.0)	127 (0.4)	818 (2.7)	3,364 (11.2)	7,719 (25.7)	8,875 (29.5)	5,802 (19.3)	2,468 (8.2)	917 (3.0)	30,093 (100.0)	17	30,110	10.70	2.66
記載なし (%)		20 (0.5)	100 (2.4)	386 (9.4)	1,028 (24.9)	1,272 (30.8)	836 (20.3)	352 (8.5)	131 (3.2)	4,125 (100.0)	736	4,861	10.84	2.65
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	0.87	1.41	1.34	0.95	0.61	0.46	0.37	0.36	0.39	0.55	0.51	0.55		
標準偏差	1.06	2.42	2.85	2.53	1.75	1.57	1.44	0.94	1.04	1.74	0.64	1.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査