

表 2974 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) PTH値(pg/mL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		20 (1.4)	69 (4.7)	200 (13.6)	410 (27.9)	430 (29.3)	229 (15.6)	80 (5.5)	29 (2.0)	1,467 (100.0)	4	1,471	10.11	2.73
20～ (%)	1 (0.1)	7 (0.4)	86 (4.5)	262 (13.7)	539 (28.3)	501 (26.3)	345 (18.1)	118 (6.2)	47 (2.5)	1,906 (100.0)	1	1,907	10.28	2.67
40～ (%)	2 (0.1)	14 (0.7)	83 (3.9)	313 (14.7)	554 (26.0)	605 (28.4)	367 (17.2)	136 (6.4)	59 (2.8)	2,133 (100.0)	2	2,135	10.33	2.70
60～ (%)		13 (0.6)	77 (3.5)	266 (11.9)	600 (26.9)	652 (29.3)	403 (18.1)	154 (6.9)	64 (2.9)	2,229 (100.0)	1	2,230	10.50	2.65
80～ (%)		7 (0.3)	89 (3.6)	315 (12.6)	678 (27.1)	715 (28.5)	445 (17.8)	193 (7.7)	64 (2.6)	2,506 (100.0)	5	2,511	10.51	2.67
100～ (%)		21 (0.9)	50 (2.0)	266 (10.8)	654 (26.6)	750 (30.5)	453 (18.4)	202 (8.2)	61 (2.5)	2,457 (100.0)	2	2,459	10.64	2.65
120～ (%)		9 (0.4)	63 (2.8)	237 (10.4)	605 (26.5)	674 (29.5)	451 (19.8)	184 (8.1)	58 (2.5)	2,281 (100.0)		2,281	10.70	2.61
140～ (%)		8 (0.4)	31 (1.5)	212 (10.4)	528 (26.0)	642 (31.6)	389 (19.1)	164 (8.1)	58 (2.9)	2,032 (100.0)	3	2,035	10.78	2.53
160～ (%)		4 (0.2)	35 (1.8)	208 (11.0)	458 (24.2)	576 (30.4)	377 (19.9)	167 (8.8)	67 (3.5)	1,892 (100.0)		1,892	10.89	2.62
180～ (%)		14 (0.3)	76 (1.7)	394 (9.0)	1,053 (24.0)	1,316 (30.1)	953 (21.8)	400 (9.1)	173 (4.0)	4,379 (100.0)	1	4,380	11.02	2.62
240～ (%)			2 (2.9)	4 (5.7)	14 (20.0)	24 (34.3)	14 (20.0)	8 (11.4)	4 (5.7)	70 (100.0)		70	11.52	2.74
241～ (%)		5 (0.2)	38 (1.5)	221 (8.6)	584 (22.7)	767 (29.8)	573 (22.3)	277 (10.8)	106 (4.1)	2,571 (100.0)	4	2,575	11.19	2.64
300～ (%)		1 (0.1)	28 (1.9)	119 (8.0)	341 (22.9)	436 (29.3)	339 (22.8)	160 (10.7)	65 (4.4)	1,489 (100.0)		1,489	11.24	2.65
360～ (%)		3 (0.3)	15 (1.6)	92 (10.0)	212 (23.0)	278 (30.1)	210 (22.8)	85 (9.2)	28 (3.0)	923 (100.0)	2	925	11.00	2.60
420～ (%)			10 (1.9)	48 (9.2)	127 (24.2)	155 (29.6)	99 (18.9)	56 (10.7)	29 (5.5)	524 (100.0)		524	11.16	2.76
480～ (%)			4 (3.2)	9 (7.2)	26 (20.8)	38 (30.4)	25 (20.0)	18 (14.4)	5 (4.0)	125 (100.0)		125	11.27	2.69
500～ (%)			2 (1.0)	18 (8.8)	38 (18.6)	56 (27.5)	49 (24.0)	31 (15.2)	10 (4.9)	204 (100.0)		204	11.57	2.80
540～ (%)			5 (2.2)	18 (7.8)	63 (27.3)	60 (26.0)	43 (18.6)	34 (14.7)	8 (3.5)	231 (100.0)	1	232	11.09	2.73
600～ (%)			3 (0.8)	26 (6.6)	102 (26.1)	104 (26.6)	95 (24.3)	46 (11.8)	15 (3.8)	391 (100.0)		391	11.32	2.58
800～ (%)			13 (3.9)	31 (9.3)	71 (21.3)	101 (30.2)	70 (21.0)	32 (9.6)	16 (4.8)	334 (100.0)		334	11.02	2.76
合計 (%)	3 (0.0)	126 (0.4)	779 (2.6)	3,259 (10.8)	7,657 (25.4)	8,880 (29.5)	5,929 (19.7)	2,545 (8.4)	966 (3.2)	30,144 (100.0)	26	30,170	10.76	2.67
記載なし (%)		7 (1.5)	27 (5.6)	78 (16.3)	130 (27.2)	130 (27.2)	70 (14.6)	29 (6.1)	7 (1.5)	478 (100.0)	98	576	9.94	2.76
総計 (%)	3 (0.0)	133 (0.4)	806 (2.6)	3,337 (10.9)	7,787 (25.4)	9,010 (29.4)	5,999 (19.6)	2,574 (8.4)	973 (3.2)	30,622 (100.0)	124	30,746	10.74	2.67
平均	50.00	107.53	149.61	159.53	169.89	179.96	189.19	204.61	205.80	178.82	152.04	178.80		
標準偏差	10.82	82.81	221.21	180.11	164.76	172.85	168.54	184.48	178.98	173.73	141.30	173.71		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査