

表 2978 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

HDL-C濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		2 (2.9)	12 (17.6)	13 (19.1)	12 (17.6)	10 (14.7)	14 (20.6)	3 (4.4)	2 (2.9)	68 (100.0)		68	9.39	3.57
20～ (%)		15 (0.9)	54 (3.4)	168 (10.5)	342 (21.4)	433 (27.1)	352 (22.0)	179 (11.2)	57 (3.6)	1,600 (100.0)	1	1,601	10.95	2.89
30～ (%)		24 (0.5)	165 (3.2)	559 (10.7)	1,209 (23.1)	1,418 (27.1)	1,063 (20.3)	547 (10.5)	246 (4.7)	5,231 (100.0)	5	5,236	10.96	2.90
40～ (%)	2 (0.0)	23 (0.4)	197 (3.1)	725 (11.3)	1,645 (25.6)	1,801 (28.1)	1,252 (19.5)	569 (8.9)	201 (3.1)	6,415 (100.0)	6	6,421	10.71	2.71
50～ (%)		16 (0.3)	114 (2.2)	564 (10.7)	1,441 (27.4)	1,582 (30.1)	992 (18.9)	403 (7.7)	143 (2.7)	5,255 (100.0)	2	5,257	10.67	2.55
60～ (%)		9 (0.3)	62 (1.8)	366 (10.6)	942 (27.2)	1,125 (32.5)	654 (18.9)	225 (6.5)	74 (2.1)	3,457 (100.0)	1	3,458	10.62	2.43
70～ (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	33 (1.8)	175 (9.6)	481 (26.3)	603 (33.0)	381 (20.8)	115 (6.3)	38 (2.1)	1,830 (100.0)	1	1,831	10.72	2.39
80～ (%)		3 (0.3)	16 (1.7)	88 (9.5)	236 (25.4)	329 (35.5)	193 (20.8)	51 (5.5)	12 (1.3)	928 (100.0)		928	10.66	2.29
90～ (%)			5 (1.3)	34 (8.6)	98 (24.8)	173 (43.8)	60 (15.2)	19 (4.8)	6 (1.5)	395 (100.0)		395	10.67	2.13
100～ (%)		1 (0.3)	5 (1.5)	35 (10.2)	94 (27.3)	121 (35.2)	68 (19.8)	16 (4.7)	4 (1.2)	344 (100.0)		344	10.56	2.20
合計 (%)	3 (0.0)	96 (0.4)	663 (2.6)	2,727 (10.7)	6,500 (25.5)	7,595 (29.8)	5,029 (19.7)	2,127 (8.3)	783 (3.1)	25,523 (100.0)	16	25,539	10.75	2.65
記載なし (%)		51 (0.6)	255 (2.9)	1,023 (11.8)	2,247 (25.8)	2,552 (29.4)	1,609 (18.5)	693 (8.0)	265 (3.0)	8,695 (100.0)	737	9,432	10.63	2.69
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	53.33	44.93	46.63	50.52	52.07	52.91	50.80	47.80	46.30	51.20	44.38	51.20		
標準偏差	14.47	18.76	16.19	17.02	16.97	17.90	17.40	15.79	15.59	17.29	12.26	17.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査