

表 2979 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

Non-HDL-C濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)		6 (1.3)	18 (3.9)	77 (16.7)	117 (25.3)	118 (25.5)	88 (19.0)	28 (6.1)	10 (2.2)	462 (100.0)	1	463	10.21	2.78
50～ (%)		7 (0.3)	67 (3.1)	248 (11.6)	527 (24.7)	611 (28.6)	428 (20.0)	197 (9.2)	50 (2.3)	2,135 (100.0)		2,135	10.70	2.66
70～ (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	134 (3.0)	510 (11.3)	1,149 (25.4)	1,330 (29.4)	894 (19.7)	349 (7.7)	149 (3.3)	4,529 (100.0)	4	4,533	10.69	2.67
90～ (%)	1 (0.0)	24 (0.4)	133 (2.4)	575 (10.4)	1,386 (25.1)	1,608 (29.1)	1,143 (20.7)	476 (8.6)	171 (3.1)	5,517 (100.0)	2	5,519	10.80	2.66
110～ (%)		11 (0.2)	106 (2.3)	441 (9.7)	1,180 (25.9)	1,405 (30.8)	891 (19.5)	374 (8.2)	150 (3.3)	4,558 (100.0)	2	4,560	10.81	2.59
130～ (%)	1 (0.0)	8 (0.3)	59 (2.1)	254 (9.2)	675 (24.4)	870 (31.5)	550 (19.9)	254 (9.2)	92 (3.3)	2,763 (100.0)	3	2,766	10.92	2.64
150～ (%)		4 (0.3)	25 (1.8)	127 (9.0)	351 (24.8)	445 (31.5)	287 (20.3)	130 (9.2)	44 (3.1)	1,413 (100.0)		1,413	10.96	2.56
170～ (%)		5 (0.8)	12 (2.0)	57 (9.6)	140 (23.6)	182 (30.6)	118 (19.9)	61 (10.3)	19 (3.2)	594 (100.0)	1	595	10.93	2.72
190～ (%)			5 (2.3)	23 (10.6)	60 (27.8)	60 (27.8)	37 (17.1)	20 (9.3)	11 (5.1)	216 (100.0)		216	10.86	2.77
210～ (%)		1 (0.9)	3 (2.6)	8 (7.0)	38 (33.0)	23 (20.0)	31 (27.0)	8 (7.0)	3 (2.6)	115 (100.0)		115	10.80	2.55
合計 (%)	3 (0.0)	79 (0.4)	562 (2.5)	2,320 (10.4)	5,623 (25.2)	6,652 (29.8)	4,467 (20.0)	1,897 (8.5)	699 (3.1)	22,302 (100.0)	13	22,315	10.79	2.64
記載なし (%)		68 (0.6)	356 (3.0)	1,430 (12.0)	3,124 (26.2)	3,495 (29.3)	2,171 (18.2)	923 (7.7)	349 (2.9)	11,916 (100.0)	740	12,656	10.59	2.68
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	103.67	105.14	102.23	103.73	107.12	107.66	107.07	108.61	108.78	106.97	106.31	106.97		
標準偏差	33.08	37.85	33.56	33.54	33.26	32.56	33.46	33.61	32.48	33.18	42.28	33.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査