

表 2981 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前拡張 期血圧	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)			5 (100.0)	1	6	11.30	1.12
20～ (%)		1 (0.9)	10 (9.0)	29 (26.1)	39 (35.1)	19 (17.1)	11 (9.9)	2 (1.8)		111 (100.0)		111	8.88	2.34
40～ (%)		23 (1.0)	125 (5.4)	486 (21.0)	787 (34.0)	585 (25.2)	221 (9.5)	65 (2.8)	26 (1.1)	2,318 (100.0)	18	2,336	9.38	2.43
60～ (%)	1 (0.0)	71 (0.5)	428 (3.3)	1,651 (12.7)	3,711 (28.6)	3,936 (30.3)	2,219 (17.1)	721 (5.5)	256 (2.0)	12,994 (100.0)	67	13,061	10.32	2.53
80～ (%)	2 (0.0)	16 (0.2)	144 (1.8)	718 (9.1)	1,866 (23.6)	2,399 (30.3)	1,750 (22.1)	759 (9.6)	258 (3.3)	7,912 (100.0)	25	7,937	11.03	2.61
90～ (%)		7 (0.2)	65 (1.4)	308 (6.6)	919 (19.7)	1,457 (31.3)	1,084 (23.3)	578 (12.4)	242 (5.2)	4,660 (100.0)	11	4,671	11.49	2.62
100～ (%)		10 (0.4)	29 (1.2)	131 (5.5)	408 (17.2)	644 (27.2)	628 (26.5)	360 (15.2)	157 (6.6)	2,367 (100.0)	7	2,374	11.87	2.74
120～ (%)			2 (1.3)	6 (4.0)	22 (14.8)	39 (26.2)	37 (24.8)	28 (18.8)	15 (10.1)	149 (100.0)		149	12.26	2.77
140～ (%)				1 (11.1)	2 (22.2)	3 (33.3)	2 (22.2)		1 (11.1)	9 (100.0)		9	11.52	3.56
合計 (%)	3 (0.0)	128 (0.4)	803 (2.6)	3,330 (10.9)	7,755 (25.4)	9,084 (29.8)	5,954 (19.5)	2,513 (8.2)	955 (3.1)	30,525 (100.0)	129	30,654	10.73	2.66
記載なし (%)		19 (0.5)	115 (3.1)	420 (11.4)	992 (26.9)	1,063 (28.8)	684 (18.5)	307 (8.3)	93 (2.5)	3,693 (100.0)	624	4,317	10.60	2.65
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	78.67	72.43	72.31	73.62	76.61	79.56	82.38	85.67	86.99	79.23	73.11	79.20		
標準偏差	3.21	14.96	14.69	14.72	14.31	14.04	14.00	14.04	14.37	14.69	15.75	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査