

表 2982 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前脈拍(拍/分)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前脈拍	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)				3 (21.4)	4 (28.6)	6 (42.9)	1 (7.1)			14 (100.0)		14	9.41	1.92
40～ (%)		3 (1.2)	8 (3.2)	46 (18.4)	64 (25.6)	81 (32.4)	33 (13.2)	12 (4.8)	3 (1.2)	250 (100.0)	2	252	9.94	2.58
50～ (%)	1 (0.0)	21 (0.9)	70 (3.1)	303 (13.4)	608 (27.0)	714 (31.7)	383 (17.0)	124 (5.5)	30 (1.3)	2,254 (100.0)	8	2,262	10.24	2.48
60～ (%)		21 (0.3)	204 (2.8)	788 (10.7)	2,020 (27.3)	2,275 (30.8)	1,398 (18.9)	531 (7.2)	156 (2.1)	7,393 (100.0)	20	7,413	10.58	2.51
70～ (%)		27 (0.3)	219 (2.4)	986 (10.7)	2,365 (25.6)	2,783 (30.1)	1,854 (20.0)	742 (8.0)	271 (2.9)	9,247 (100.0)	37	9,284	10.77	2.63
80～ (%)		25 (0.4)	145 (2.4)	676 (11.0)	1,463 (23.7)	1,782 (28.9)	1,257 (20.4)	580 (9.4)	239 (3.9)	6,167 (100.0)	37	6,204	10.90	2.71
90～ (%)		14 (0.5)	92 (3.3)	275 (9.8)	634 (22.5)	795 (28.2)	578 (20.5)	294 (10.4)	138 (4.9)	2,820 (100.0)	17	2,837	11.01	2.85
100～ (%)	1 (0.1)	10 (1.1)	33 (3.6)	95 (10.3)	225 (24.5)	229 (24.9)	165 (17.9)	104 (11.3)	58 (6.3)	920 (100.0)	5	925	10.96	3.13
110～ (%)	1 (0.4)	2 (0.9)	6 (2.6)	23 (10.0)	67 (29.1)	58 (25.2)	39 (17.0)	17 (7.4)	17 (7.4)	230 (100.0)		230	10.83	3.17
120～ (%)			4 (4.4)	15 (16.7)	28 (31.1)	23 (25.6)	13 (14.4)	4 (4.4)	3 (3.3)	90 (100.0)		90	10.09	2.75
合計 (%)	3 (0.0)	123 (0.4)	781 (2.7)	3,210 (10.9)	7,478 (25.4)	8,746 (29.8)	5,721 (19.5)	2,408 (8.2)	915 (3.1)	29,385 (100.0)	126	29,511	10.73	2.66
記載なし (%)		24 (0.5)	137 (2.8)	540 (11.2)	1,269 (26.3)	1,401 (29.0)	917 (19.0)	412 (8.5)	133 (2.8)	4,833 (100.0)	627	5,460	10.67	2.65
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	92.00	76.10	75.66	74.82	74.81	74.82	75.89	77.47	80.23	75.44	77.47	75.45		
標準偏差	31.24	16.24	13.97	13.37	12.99	12.62	12.45	12.65	13.10	12.89	12.72	12.89		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査