

表 2983 クレアチニン濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	2 (0.1)	77 (2.0)	282 (7.4)	626 (16.4)	796 (20.9)	714 (18.7)	623 (16.3)	421 (11.0)	276 (7.2)	3,817 (100.0)	1,925	5,742	10.54	3.66
女性 (%)	15 (0.7)	77 (3.6)	293 (13.6)	507 (23.5)	553 (25.6)	401 (18.6)	225 (10.4)	67 (3.1)	19 (0.9)	2,157 (100.0)	1,042	3,199	8.72	2.95
合計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
記載なし (%)														
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査