

表 2985 クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	8 (0.3)	100 (4.2)	396 (16.4)	659 (27.4)	573 (23.8)	305 (12.7)	216 (9.0)	94 (3.9)	58 (2.4)	2,409 (100.0)	1,191	3,600	8.55	3.23
2年～ (%)	4 (0.2)	38 (1.8)	140 (6.7)	335 (16.1)	465 (22.4)	455 (21.9)	320 (15.4)	195 (9.4)	128 (6.2)	2,080 (100.0)	1,121	3,201	10.40	3.51
5年～ (%)	5 (0.4)	12 (1.1)	33 (2.9)	114 (10.0)	230 (20.2)	271 (23.8)	230 (20.2)	160 (14.0)	86 (7.5)	1,141 (100.0)	516	1,657	11.32	3.31
10年～ (%)		1 (0.4)	4 (1.7)	11 (4.7)	48 (20.6)	59 (25.3)	53 (22.7)	35 (15.0)	22 (9.4)	233 (100.0)	107	340	11.88	3.02
15年～ (%)		2 (2.7)	1 (1.4)	9 (12.2)	19 (25.7)	19 (25.7)	19 (25.7)	4 (5.4)	1 (1.4)	74 (100.0)	23	97	10.55	2.75
20年～ (%)		1 (6.3)		1 (6.3)	5 (31.3)	5 (31.3)	4 (25.0)			16 (100.0)	4	20	10.12	2.86
25年～ (%)				2 (25.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	2 (25.0)			8 (100.0)		8	9.81	2.37
30年～ (%)				1 (12.5)	3 (37.5)		4 (50.0)			8 (100.0)	2	10	11.11	2.69
35年～ (%)				1 (33.3)	2 (66.7)					3 (100.0)		3	7.83	1.22
40年～ (%)														
合計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	574 (9.6)	1,133 (19.0)	1,348 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,972 (100.0)	2,964	8,936	9.89	3.53
不明 (%)			1 (50.0)		1 (50.0)					2 (100.0)	3	5	7.50	2.97
記載なし (%)														
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	2.41	1.78	1.33	2.00	3.11	3.86	4.39	4.32	4.18	3.17	2.96	3.10		
標準偏差	2.81	3.06	1.98	3.08	4.08	3.68	4.30	3.24	3.24	3.72	3.23	3.56		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査