

表 2986 クレアチニン濃度(mg/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	6 (0.3)	26 (1.3)	107 (5.2)	307 (14.8)	469 (22.6)	416 (20.0)	369 (17.8)	233 (11.2)	144 (6.9)	2,077 (100.0)	982	3,059	10.75	3.46
慢性腎盂腎炎 （％）		2 (2.9)	10 (14.7)	14 (20.6)	11 (16.2)	13 (19.1)	10 (14.7)	4 (5.9)	4 (5.9)	68 (100.0)	25	93	9.59	3.51
急速進行性糸球 体腎炎 （％）	1 (2.0)	1 (2.0)	5 (10.0)	10 (20.0)	10 (20.0)	14 (28.0)	3 (6.0)	5 (10.0)	1 (2.0)	50 (100.0)	24	74	9.48	3.51
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		1 (4.0)		5 (20.0)	7 (28.0)	7 (28.0)	5 (20.0)			25 (100.0)	7	32	9.80	2.48
その他の分類不 能の腎炎 （％）		2 (3.4)	4 (6.8)	5 (8.5)	15 (25.4)	10 (16.9)	13 (22.0)	3 (5.1)	7 (11.9)	59 (100.0)	26	85	10.79	3.93
多発性嚢胞腎 （％）		2 (1.3)	10 (6.4)	31 (19.9)	29 (18.6)	41 (26.3)	21 (13.5)	17 (10.9)	5 (3.2)	156 (100.0)	87	243	10.15	3.16
腎硬化症 （％）	2 (0.3)	28 (3.8)	105 (14.1)	172 (23.1)	181 (24.3)	125 (16.8)	77 (10.3)	30 (4.0)	24 (3.2)	744 (100.0)	339	1,083	9.01	3.51
悪性高血圧 （％）		1 (1.4)	6 (8.7)	11 (15.9)	14 (20.3)	13 (18.8)	4 (5.8)	8 (11.6)	12 (17.4)	69 (100.0)	38	107	11.06	4.45
糖尿病性腎症 （％）	1 (0.1)	50 (2.8)	219 (12.2)	426 (23.8)	402 (22.4)	310 (17.3)	222 (12.4)	121 (6.7)	42 (2.3)	1,793 (100.0)	973	2,766	9.26	3.20
SLE腎炎 （％）	1 (2.2)		9 (20.0)	10 (22.2)	10 (22.2)	9 (20.0)	2 (4.4)	2 (4.4)	2 (4.4)	45 (100.0)	17	62	8.77	3.35
アミロイド腎 （％）			1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)		1 (25.0)			4 (100.0)	5	9	8.60	3.34
痛風腎 （％）		1 (4.0)		2 (8.0)	6 (24.0)	5 (20.0)	7 (28.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	25 (100.0)	8	33	11.41	3.75
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			4 (28.6)	4 (28.6)	1 (7.1)	3 (21.4)	1 (7.1)	1 (7.1)		14 (100.0)	4	18	8.61	3.43
腎・尿路結核 （％）					1 (100.0)					1 (100.0)		1	9.10	
腎・尿路結石 （％）		1 (10.0)		1 (10.0)	1 (10.0)	6 (60.0)	1 (10.0)			10 (100.0)	6	16	9.51	2.71
腎・尿路腫瘍 （％）			1 (11.1)	2 (22.2)	1 (11.1)	4 (44.4)	1 (11.1)			9 (100.0)	5	14	9.43	2.72
閉塞性尿路障害 （％）		1 (6.3)	1 (6.3)	3 (18.8)	2 (12.5)	2 (12.5)	1 (6.3)	4 (25.0)	2 (12.5)	16 (100.0)	6	22	11.34	5.02
骨髄腫 （％）			1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)		1 (20.0)			5 (100.0)	3	8	8.02	2.64
腎形成不全 （％）		5 (9.1)	5 (9.1)	11 (20.0)	6 (10.9)	6 (10.9)	10 (18.2)	6 (10.9)	6 (10.9)	55 (100.0)	21	76	10.21	4.40
不明 （％）	4 (0.7)	21 (3.8)	63 (11.5)	93 (16.9)	130 (23.6)	107 (19.5)	70 (12.7)	34 (6.2)	28 (5.1)	550 (100.0)	290	840	9.60	3.65
再導入 （％）				4 (11.1)	10 (27.8)	3 (8.3)	9 (25.0)	6 (16.7)	4 (11.1)	36 (100.0)	15	51	11.87	3.49
その他 （％）	2 (1.2)	12 (7.4)	24 (14.7)	20 (12.3)	40 (24.5)	21 (12.9)	20 (12.3)	12 (7.4)	12 (7.4)	163 (100.0)	86	249	9.53	4.14
合計 （％）	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
記載なし （％）														
総計 （％）	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査