

表 2987 クレアチニン濃度(mg/dL) 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	1	12	46	97	126	93	68	33	26	502	211	713	9.79	3.45
(%)	(0.2)	(2.4)	(9.2)	(19.3)	(25.1)	(18.5)	(13.5)	(6.6)	(5.2)	(100.0)				
私立大学		13	42	129	173	120	102	57	30	666	467	1,133	10.13	3.37
(%)		(2.0)	(6.3)	(19.4)	(26.0)	(18.0)	(15.3)	(8.6)	(4.5)	(100.0)				
国立		8	24	39	31	24	14	4	4	148	54	202	8.52	3.23
(%)		(5.4)	(16.2)	(26.4)	(20.9)	(16.2)	(9.5)	(2.7)	(2.7)	(100.0)				
県市町村立	2	31	114	194	213	193	147	79	49	1,022	564	1,586	9.76	3.45
(%)	(0.2)	(3.0)	(11.2)	(19.0)	(20.8)	(18.9)	(14.4)	(7.7)	(4.8)	(100.0)				
社会保険		1	12	51	58	36	20	16	11	205	282	487	10.03	3.54
(%)		(0.5)	(5.9)	(24.9)	(28.3)	(17.6)	(9.8)	(7.8)	(5.4)	(100.0)				
厚生連	1	6	33	112	110	98	68	31	18	477	149	626	9.81	3.20
(%)	(0.2)	(1.3)	(6.9)	(23.5)	(23.1)	(20.5)	(14.3)	(6.5)	(3.8)	(100.0)				
その他公的	2	32	131	209	204	154	108	73	33	946	373	1,319	9.29	3.47
(%)	(0.2)	(3.4)	(13.8)	(22.1)	(21.6)	(16.3)	(11.4)	(7.7)	(3.5)	(100.0)				
私立総合	1	1	10	33	52	49	48	21	13	228	149	377	10.80	3.24
(%)	(0.4)	(0.4)	(4.4)	(14.5)	(22.8)	(21.5)	(21.1)	(9.2)	(5.7)	(100.0)				
私立	8	38	117	172	253	204	168	98	59	1,117	572	1,689	9.92	3.79
(%)	(0.7)	(3.4)	(10.5)	(15.4)	(22.6)	(18.3)	(15.0)	(8.8)	(5.3)	(100.0)				
私立診療所	2	12	46	97	129	144	105	76	52	663	146	809	10.70	3.60
(%)	(0.3)	(1.8)	(6.9)	(14.6)	(19.5)	(21.7)	(15.8)	(11.5)	(7.8)	(100.0)				
総計	17	154	575	1,133	1,349	1,115	848	488	295	5,974	2,967	8,941	9.89	3.53
(%)	(0.3)	(2.6)	(9.6)	(19.0)	(22.6)	(18.7)	(14.2)	(8.2)	(4.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査