

表 2989 クレアチニン濃度(mg/dL) アルブミン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

アルブミン 濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)		4 (28.6)	3 (21.4)	3 (21.4)	2 (14.3)	2 (14.3)				14 (100.0)	1	15	6.18	3.07
1.5～ (%)	3 (4.3)	9 (12.9)	16 (22.9)	24 (34.3)	13 (18.6)	4 (5.7)			1 (1.4)	70 (100.0)	1	71	6.52	2.62
2.0～ (%)	2 (0.7)	20 (6.8)	66 (22.4)	83 (28.2)	72 (24.5)	34 (11.6)	14 (4.8)	3 (1.0)		294 (100.0)	4	298	7.53	2.60
2.5～ (%)	3 (0.3)	30 (2.9)	133 (13.0)	236 (23.0)	246 (24.0)	193 (18.8)	119 (11.6)	52 (5.1)	14 (1.4)	1,026 (100.0)	11	1,037	9.05	3.07
3.0～ (%)	4 (0.2)	31 (1.4)	179 (8.4)	362 (16.9)	495 (23.1)	437 (20.4)	356 (16.6)	191 (8.9)	88 (4.1)	2,143 (100.0)	15	2,158	10.15	3.32
3.5～ (%)	5 (0.3)	39 (2.1)	141 (7.4)	343 (18.1)	401 (21.2)	361 (19.1)	280 (14.8)	186 (9.8)	137 (7.2)	1,893 (100.0)	13	1,906	10.33	3.62
4.0～ (%)		13 (3.0)	28 (6.6)	68 (15.9)	95 (22.2)	68 (15.9)	64 (15.0)	47 (11.0)	44 (10.3)	427 (100.0)	4	431	10.82	4.18
4.5～ (%)		1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	6 (28.6)	2 (9.5)	1 (4.8)	5 (23.8)	4 (19.0)	21 (100.0)		21	12.06	4.72
5.0～ (%)		1 (50.0)							1 (50.0)	2 (100.0)		2	10.80	11.74
合計 (%)	17 (0.3)	148 (2.5)	567 (9.6)	1,120 (19.0)	1,330 (22.6)	1,101 (18.7)	834 (14.2)	484 (8.2)	289 (4.9)	5,890 (100.0)	49	5,939	9.89	3.52
記載なし (%)		6 (7.1)	8 (9.5)	13 (15.5)	19 (22.6)	14 (16.7)	14 (16.7)	4 (4.8)	6 (7.1)	84 (100.0)	2,918	3,002	9.70	3.89
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	2.95	3.04	3.08	3.19	3.26	3.30	3.36	3.46	3.59	3.28	3.14	3.28		
標準偏差	0.71	0.75	0.59	0.56	0.51	0.46	0.42	0.41	0.41	0.52	0.61	0.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査