

表 2990 クレアチニン濃度(mg/dL) CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	11 (0.4)	51 (1.7)	270 (8.8)	562 (18.4)	688 (22.5)	599 (19.6)	444 (14.5)	260 (8.5)	168 (5.5)	3,053 (100.0)	14	3,067	10.08	3.48
0.2～ (%)	2 (0.2)	24 (2.4)	98 (9.9)	203 (20.6)	224 (22.7)	171 (17.3)	141 (14.3)	76 (7.7)	47 (4.8)	986 (100.0)	9	995	9.77	3.47
0.5～ (%)	1 (0.2)	16 (3.6)	48 (10.8)	82 (18.4)	93 (20.9)	99 (22.2)	64 (14.4)	29 (6.5)	13 (2.9)	445 (100.0)	4	449	9.60	3.31
1.0～ (%)		10 (3.3)	36 (11.8)	60 (19.7)	69 (22.6)	59 (19.3)	35 (11.5)	22 (7.2)	14 (4.6)	305 (100.0)	3	308	9.57	3.47
2.0～ (%)		8 (4.0)	26 (13.0)	47 (23.5)	45 (22.5)	30 (15.0)	20 (10.0)	13 (6.5)	11 (5.5)	200 (100.0)	2	202	9.28	3.50
4.0～ (%)		3 (3.7)	11 (13.4)	14 (17.1)	24 (29.3)	11 (13.4)	9 (11.0)	9 (11.0)	1 (1.2)	82 (100.0)	1	83	9.26	3.42
6.0～ (%)	1 (2.6)	1 (2.6)	3 (7.7)	11 (28.2)	10 (25.6)	5 (12.8)	6 (15.4)	2 (5.1)		39 (100.0)	1	40	9.08	3.16
8.0～ (%)		1 (4.2)	3 (12.5)	3 (12.5)	8 (33.3)	3 (12.5)	4 (16.7)	1 (4.2)	1 (4.2)	24 (100.0)		24	9.30	3.32
10.0～ (%)		4 (11.8)	2 (5.9)	5 (14.7)	7 (20.6)	6 (17.6)	3 (8.8)	5 (14.7)	2 (5.9)	34 (100.0)		34	10.04	4.23
15.0～ (%)		1 (14.3)	1 (14.3)	5 (71.4)						7 (100.0)		7	6.00	1.46
合計 (%)	15 (0.3)	119 (2.3)	498 (9.6)	992 (19.2)	1,168 (22.6)	983 (19.0)	726 (14.0)	417 (8.1)	257 (5.0)	5,175 (100.0)	34	5,209	9.89	3.48
記載なし (%)	2 (0.3)	35 (4.4)	77 (9.6)	141 (17.6)	181 (22.7)	132 (16.5)	122 (15.3)	71 (8.9)	38 (4.8)	799 (100.0)	2,933	3,732	9.85	3.85
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	0.67	1.25	0.70	0.74	0.63	0.52	0.53	0.61	0.47	0.63	0.81	0.63		
標準偏差	2.01	2.65	1.64	2.33	1.52	1.33	1.45	1.62	1.34	1.71	1.54	1.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査