

表 2993 クレアチニン濃度(mg/dL) PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		5 (4.1)	12 (9.9)	16 (13.2)	23 (19.0)	30 (24.8)	16 (13.2)	11 (9.1)	8 (6.6)	121 (100.0)	2	123	10.08	3.64
20～ (%)		6 (2.2)	18 (6.5)	42 (15.1)	80 (28.8)	55 (19.8)	32 (11.5)	24 (8.6)	21 (7.6)	278 (100.0)	3	281	10.31	3.54
40～ (%)	1 (0.4)	5 (1.9)	13 (4.9)	53 (20.0)	60 (22.6)	49 (18.5)	48 (18.1)	21 (7.9)	15 (5.7)	265 (100.0)	3	268	10.23	3.37
60～ (%)	2 (0.6)	5 (1.6)	25 (8.1)	41 (13.3)	78 (25.2)	67 (21.7)	54 (17.5)	26 (8.4)	11 (3.6)	309 (100.0)	6	315	10.26	3.71
80～ (%)	2 (0.7)	5 (1.6)	26 (8.5)	49 (16.1)	76 (24.9)	68 (22.3)	35 (11.5)	29 (9.5)	15 (4.9)	305 (100.0)	4	309	10.10	3.63
100～ (%)	1 (0.3)	14 (4.5)	28 (8.9)	56 (17.9)	72 (23.0)	60 (19.2)	43 (13.7)	24 (7.7)	15 (4.8)	313 (100.0)	3	316	9.78	3.55
120～ (%)	1 (0.3)	5 (1.7)	29 (9.7)	55 (18.3)	61 (20.3)	58 (19.3)	42 (14.0)	27 (9.0)	22 (7.3)	300 (100.0)	5	305	10.24	3.59
140～ (%)	2 (0.7)	6 (2.1)	18 (6.3)	58 (20.4)	60 (21.1)	61 (21.5)	44 (15.5)	19 (6.7)	16 (5.6)	284 (100.0)	1	285	10.02	3.46
160～ (%)	1 (0.4)	6 (2.2)	29 (10.6)	48 (17.6)	59 (21.6)	54 (19.8)	47 (17.2)	20 (7.3)	9 (3.3)	273 (100.0)	3	276	9.83	3.37
180～ (%)	2 (0.3)	15 (2.3)	64 (9.9)	127 (19.7)	134 (20.7)	125 (19.3)	95 (14.7)	57 (8.8)	27 (4.2)	646 (100.0)	8	654	9.91	3.51
240～ (%)		1 (10.0)	1 (10.0)	5 (50.0)		2 (20.0)	1 (10.0)			10 (100.0)		10	9.66	2.81
241～ (%)		7 (1.6)	36 (8.5)	84 (19.8)	100 (23.5)	80 (18.8)	55 (12.9)	46 (10.8)	17 (4.0)	425 (100.0)	6	431	9.94	3.36
300～ (%)		9 (2.7)	31 (9.4)	65 (19.6)	80 (24.2)	60 (18.1)	50 (15.1)	25 (7.6)	11 (3.3)	331 (100.0)		331	9.71	3.27
360～ (%)		3 (1.5)	22 (11.2)	42 (21.4)	45 (23.0)	21 (10.7)	32 (16.3)	18 (9.2)	13 (6.6)	196 (100.0)	4	200	9.98	3.65
420～ (%)		2 (1.5)	13 (9.6)	32 (23.5)	32 (23.5)	21 (15.4)	21 (15.4)	8 (5.9)	7 (5.1)	136 (100.0)	3	139	9.79	3.42
480～ (%)			2 (4.8)	12 (28.6)	6 (14.3)	6 (14.3)	3 (7.1)	6 (14.3)	7 (16.7)	42 (100.0)	1	43	11.22	4.14
500～ (%)		1 (1.9)	5 (9.3)	9 (16.7)	8 (14.8)	10 (18.5)	8 (14.8)	6 (11.1)	7 (13.0)	54 (100.0)		54	10.93	4.32
540～ (%)			8 (11.3)	11 (15.5)	22 (31.0)	16 (22.5)	7 (9.9)	3 (4.2)	4 (5.6)	71 (100.0)	2	73	9.73	3.10
600～ (%)		2 (1.9)	6 (5.8)	16 (15.4)	24 (23.1)	16 (15.4)	21 (20.2)	12 (11.5)	7 (6.7)	104 (100.0)	1	105	10.68	3.68
800～ (%)		1 (0.9)	15 (13.8)	23 (21.1)	18 (16.5)	21 (19.3)	13 (11.9)	13 (11.9)	5 (4.6)	109 (100.0)	1	110	9.88	3.47
合計 (%)	12 (0.3)	97 (2.1)	401 (8.8)	840 (18.4)	1,043 (22.8)	878 (19.2)	668 (14.6)	396 (8.7)	237 (5.2)	4,572 (100.0)	56	4,628	10.03	3.51
記載なし (%)	3 (1.5)	15 (7.7)	31 (16.0)	41 (21.1)	42 (21.6)	30 (15.5)	20 (10.3)	9 (4.6)	3 (1.5)	194 (100.0)	182	376	8.51	3.54
総計 (%)	15 (0.3)	112 (2.3)	432 (9.1)	881 (18.5)	1,085 (22.8)	908 (19.1)	688 (14.4)	405 (8.5)	240 (5.0)	4,766 (100.0)	238	5,004	9.97	3.53
平均	123.58	188.59	247.62	236.19	216.01	212.93	218.16	239.42	227.48	224.01	212.82	223.88		
標準偏差	53.36	161.48	261.66	225.12	223.76	249.66	191.01	257.62	213.56	229.84	181.93	229.31		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査